

F L O R A
P A R I S I E N S I S ,
O U
D E S C R I P T I O N S E T F I G U R E S
D E S P L A N T E S

Q U I C R O I S S E N T A U X E N V I R O N S D E P A R I S ;

A V E C

Les différens Noms, Classes, Ordres & Genres
qui leur conviennent, rangés suivant la méthode
sexuelle de M. LINNÉ; leurs Parties caracté-
ristiques, Ports, Propriétés, Vertus & Doses d'usage
en médecine, suivant les Démonstrations de Bo-
tanique qui se font au Jardin du Roi.

Par M. BULLIARD.

Ouvrage orné de plus de 600 Figures coloriées d'après nature.

T O M E Q U A T R I È M E ,



A P A R I S ,

Chez P. FR. DIDOT le jeune, Libraire, quai
des Augustins.

M. DCC. LXXIX.

A V E C A P P R O B A T I O N , E T P R I V I L È G E D U R O I .



9.31-2403

15^e Classe, DIDYNAMIE. Ordre, GYMNOSPERMIE.
 Genre de Lin. *AJUGA*.

HERBE BISANNUELLE.

Noms { latin. *Ajuga pyramidalis*, Lin.
 françois. LA BUGLE VELUE.
 —vulgaire. LA BUGLE SAUVAGE.

Détail des parties caractéristiques.

1. Une fleur labiée de grandeur naturelle , vue de côté.
2. Une fleur vue de face.
3. Une fleur dessinée à la loupe , quatre grandes étamines & deux petites.
4. Le calice dessiné à la loupe ; il sert de base à quatre germes surmontés d'un style bifurqué , qui , dans l'état de maturité , deviennent quatre semences allongées & nues.

PORT. Ses tiges s'élevent de trois ou quatre pouces : on la trouve dans les bois , les taillis ; elle fleurit au mois de Juin. Herb. II. VI.

PROPRIÉTÉS. On croit ses propriétés semblables à celles de la Bugle commune ; mais on s'en sert rarement en médecine.



Bugle velutina

14^e Classe, DIDYNAMIE. Ordre, GYMNOSPERMIE.

Genre de Lin. *AJUGA*.

P L A N T E V I V A C E .

Noms { latin. *Ajuga reptans*, Lin.
françois. LA BUGLE SAUVAGE.
—vulgaires. LA BUGLE VELUE, LA PETITE
CONSOUDE, LA TRAINASSE.

Détail des parties caractéristiques.

1. Une fleur de grandeur naturelle, vue de côté.
2. Une fleur dessinée à la loupe, vue de face; c'est une corolle labiée, à laquelle sont attachées quatre étamines, deux grandes & deux petites.
3. Le calice dessiné à la loupe; le pistil repose sur quatre graines nues.

PORT. Il y a des tiges qui s'élevent à la hauteur de cinq ou six pouces, & portent des fleurs; tandis que les autres sont rampantes, & ne portent ni fleurs ni fruits. Cette plante croît abondamment dans les bois, les prés: elle fleurit au mois de Mai. Herb. II, V, VI.

PROPRIÉTÉS. Toute la plante est astringente, vulnéraire, résolutive, foiblement apéritive.

USAGES. La bugle s'emploie seule ou avec d'autres plantes, comme vulnéraire; on en fait prendre le suc ou la décoction, & elle entre dans la plupart des anciennes compositions vulnéraires; on en fait boire le suc ou l'infusion ou la décoction dans la dyssenterie, les hémorrhagies, les cas d'efforts, chûtes, contusions.



Bugle.

1^{re} Classe, DIDYNAMIE. Ordre, GYMNOSPERMIE.

Genre de Lin. *TEUCRIUM*.

HERBE ANNUELLE.

Noms { latin. *Teucrium Botrys*, Lin.
 { françois.
 { —vulg. L'HERBE DE SAINT-MICHEL.

Détail des parties caractéristiques.

Les fleurs des *Teucrium* sont faciles à distinguer par leur corolle qui n'a qu'une lèvre; les étamines sont longues, & tiennent lieu de lèvre supérieure.

1. Fleur vue de face, dessinée à la loupe.
2. Fleur vue de côté, dessinée à la loupe.
3. Fleur de grandeur naturelle.
4. Feuille de grandeur naturelle.

PORT. Ses tiges s'élèvent de six à sept pouces. On la trouve dans les terrains secs & arides; elle fleurit en juillet & août. Herb. II. VI.



1



2



3

4

Teucrium Botrys

14^e Classe, DIDYNAMIE. Ordre, GYMNOS-PERMIE.
Genre de Lin. *TEUCRIUM*.

H E R B E A N N U E L L E .

Noms { latin. *Teucrium Chamæpytis*, Lin.
françois. L'IVETTE.
— vulgaires. LE CHAMÉPITIS, LA LI-
VETTE, LE BARBET.


Détail des parties caractéristiques.

1. Une fleur de grandeur naturelle, vue de côté.
2. Une fleur ouverte : on voit les étamines qui y sont attachées ; elles sont au nombre de quatre, deux petites & deux grandes.
3. Le calice.
4. Le germe surmonté d'un fil bifurqué.

PORT. Ses tiges sont représentées de grandeur naturelle ; elles sont légèrement velues. Elle fleurit à la fin de l'été : on la trouve dans les champs, les terrains sablonneux. Herb. V.

PROPRIÉTÉS. Si on la broie entre les doigts, elle a une légère odeur de poix ; elle est très-amère au goût ; elle passe pour fébrifuge, vulnéraire, astringente, céphalique.

USAGES. On fait avec les feuilles & les fleurs des décoctions & des infusions apéritives, fébrifuges, vulnéraires ; elle entre dans divers remèdes contre la goutte & les douleurs de rhumatisme,



1^{re} Classe, DIDYNAMIE. Ordre, GYMNOSPERNIE.

Genre de Lin. *TEUCRIUM*.

H E R B E V I V A C E .

Noms { latin. *Teucrium*, *Scorodonia*, Lin.
françois. LA SAUGE DES BOIS.
—vulgaires. LE CHAMARAS DES BOIS,
LE FAUX SCORDIUM, LA SAUGE DES
FORÊTS.

Détail des parties caractéristiques.

1. Epi de fleurs de grandeur naturelle.
2. Une fleur ouverte afin de laisser voir les étamines qu'elle renferme.
3. Un calice deffiné à la loupe.

PORT. Ses tiges s'élèvent de deux pieds : on la trouve dans les bois ; elle fleurit sur la fin de l'été.
Herb. VI.

PROPRIÉTÉS. Les feuilles ont un goût herbacé un peu âcre, & une foible odeur de scordium ; les fleurs n'ont pas d'odeur.

On dit cette plante astringente, apéritive, vulnéraire, mais à un degré plus foible que le scordium ou chamaras.



Sauge des bois

1^he Classe, DIDYNAMIE. Ordre, GYMNOSPERMIE.
Genre de Lin. *TEUCRIUM*.

H E R B E V I V A C E .

Noms { latin. *Teucrium Scordium*, Lin.
françois. LE SCORDIUM.
—vulgaires. LE VRAI SCORDIUM, LA
GERMANDRÉE AQUATIQUE, LE CHA-
MARRAS.

Détail des parties caractéristiques.

A. Extrémité supérieure d'une tige de grandeur naturelle.

1. 2. Fleurs dessinées à la loupe ; elles sont monopétales, découpées en cinq parties ; elles ont quatre étamines qui tiennent lieu de lèvres supérieure ; les calices sont d'une seule pièce, divisés en cinq parties, & contiennent quatre semences nues.

PORT. Les tiges sont longues d'un pied ou environ ; elles sont rampantes ; & s'élèvent rarement à plus de sept à huit pouces. On trouve cette plante dans les endroits marécageux, dans les terrains humides ; elle fleurit sur la fin de l'été. Herb. VI.

PROPRIÉTÉS. Elle a une odeur forte, aromatique qui tient un peu de l'ail, une saveur amère ; elle est fébrifuge, vermifuge, diaphorétique, sudorifique, vulnéraire.

USAGES. On en fait des infusions comme du thé, & on en recommande l'usage dans les fièvres malignes, la petite vérole, les maladies de la peau. On dit qu'un long usage de cette plante a guéri la goutte.



A

2

1



Scordium.

1^{re} Classe, DIDYNAMIE. Ordre, GYMNOSPERMIE.
 Genre de Lin. *TEUCRIUM*.

P L A N T E V I V A C E .

Noms { latin *Teucrium Chamædrys*, Lin.
 françois LA GERMANDRÉE.
 —vulgaire le PETIT CHÊNE, l'HERBE DES
 FIEVRES, le CALAMANDRIER, le SCEAU de
 la fievre, la CHÊNETTE.

Détail des parties caractéristiques.

1. Une fleur de grandeur naturelle, vue de face.
2. Une fleur avec son calice, vue de côté.
3. Quatre étamines, deux grandes & deux petites, avec un pistil.
4. Ces étamines tiennent lieu de levre supérieure à la fleur.
5. Quatre graines nues au fond du calice.
6. Forme des graines.
7. Le pistil bifurqué, tenant à l'ovaire.

PORT. Cette plante s'éleve de huit ou dix pouces ; elle fleurit en Juillet, Août & Septembre : elle croît dans les bois, à l'exposition du midi, & dans les terrains secs, Herb. II, IV, V.

PROPRIÉTÉS. Les feuilles & les sommités des tiges ont une saveur amere, sont un peu astringentes & aromatiques.

USAGE. On les recommande comme sudorifiques, diurétiques, emménagogues, toniques ou propres à fortifier l'estomac & autres viscères ; & contre les fievres intermittentes, les cachexies.