В.Н. Чарушин
Э.В. Носова
Г.Н. Липунова
О.Н. Чупахин

ФТОРХИНОЛОНЫ СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ

В.Н. Чарушин
Э.В. Носова
Г.Н. Липунова
О.Н. Чупахин

ФТОРХИНОЛОНЫ СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ

МОСКВА
ФИЗМАТЛИТ®
2013

УДК 547.8
ББК 24.236
Ф 82

*Издание осуществлено при поддержке
Российского фонда фундаментальных
исследований по проекту 13-08-07000,
не подлежит продаже*

*Монография подготовлена при финансо-
вой поддержке Совета по грантам при
Президенте РФ; грант НШ-5505.2012.3*

Чарушин В.Н., Носова Э.В., Липунова Г.Н., Чупахин О.Н.
Фторхинолоны: синтез и применение. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. —
320 с. — ISBN 978-5-9221-1478-3.

Книга посвящена фторсодержащим 4-оксо-3-хинолинкарбоновым кислотам, так называемым фторхинолонам, которые представляют современный класс антибактериальных препаратов. Проанализированы синтетические подходы к би- и полициклическим фторхинолонам. Обсуждается взаимосвязь структуры и антибактериальной активности, рассмотрены другие виды биологической активности фторхинолонов. Описаны металлокомплексы фторхинолонкарбоновых кислот. Большое внимание уделено отдельным представителям, нашедшим применение в медицинской практике.

Книга ориентирована на специалистов, работающих в области органической, гетероциклической, фармацевтической химии, преподавателей вузов, аспирантов и студентов.

ISBN 978-5-9221-1478-3

© ФИЗМАТЛИТ, 2013

© В.Н. Чарушин, Э.В. Носова,
Г.Н. Липунова, О.Н. Чупахин, 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава 1. Синтез, строение и антибактериальная активность бициклических фторхинолонов	16
1.1. Методы построения фторхинолонового остова	16
1.2. Взаимосвязь структуры и антибактериальной активности	24
Список литературы	119
Глава 2. Синтез, строение и антибактериальная активность полициклических фторхинолонов	148
2.1. [a]-Аннелированные фторхинолоны	148
2.2. [b]-Аннелированные фторхинолоны	162
2.3. [c]-Аннелированные фторхинолоны	167
2.4. [d,e]-Аннелированные фторхинолоны	168
2.5. [f]-Аннелированные фторхинолоны	168
2.6. [g]-Аннелированные фторхинолоны	170
2.7. [h]-Аннелированные фторхинолоны	172
2.8. [i,j]-Аннелированные фторхинолоны	180
2.9. Тетрациклические [a,i,j]-аннелированные фторхинолоны	212
Список литературы	214
Глава 3. Другие виды биологической активности	227
3.1. Фторхинолоны, проявляющие противоопухолевую активность	227
3.2. Фторхинолоны, проявляющие туберкулостатическую активность	240

3.3. Фторхинолоны, проявляющие противовирусную активность	246
3.4. Фторхинолоны, проявляющие другие виды активности.	253
Список литературы	260
Глава 4. Металлокомплексы фторхинолонкарбоновых кислот	267
4.1. Синтез, структура и биологическая активность металлохелатов фторхинолонов	268
4.2. Исследование взаимодействия металлокомплексов с ДНК.	310
Список литературы	313
Дополнительная литература.	316

Введение

Прошло почти три десятилетия с тех пор, как на мировом фармацевтическом рынке появились первые антибактериальные препараты фторхинолонового ряда, такие как норфлоксацин, пефлоксацин, цiproфлоксацин и офлоксацин.

Производные 4-оксо-3-хинолинкарбоновой кислоты, так называемые хинолоны, были известны с начала 60-х годов, однако хинолоны первого поколения (налидиксовая кислота, оксолиниевая кислота, пипемидиевая кислота и др.) не содержали фтора и были активны в отношении лишь ограниченного ряда бактериальных инфекций.

Первым препаратом этой группы, до сих пор сохранившим значение, является налидиксовая кислота (1-этил-1,4-дигидро-7-метил-4-оксо-1,8-нафтиридин-3-карбоновая кислота), внедренная в медицинскую практику в 1963 г. [1–3].

Модификация ядра фторхинолоновой структуры, связанная с введением в молекулу атома фтора, обеспечила значительное улучшение антимикробных свойств и открыла новые перспективы в клиническом лечении инфекций. По уровню активности и спектру антибактериального действия фторхинолоны превосходят многие антибиотики, в том числе цефалоспорины третьего поколения и другие химиотерапевтические средства. Благодаря влиянию на процессы размножения бактерий путем ингибирования бактериальной ДНК-гиразы — фермента, отвечающего за разрыв и восстановление двойной спирали ДНК, фторхинолоны обладают высокой антибактериальной активностью. Крайне важно, что механизм действия фторхинолонов отличен от механизмов

действия других групп антибактериальных препаратов (цефалоспоринов, аминогликозидов и др.), что позволяет эффективно использовать их для лечения инфекционных заболеваний, вызванных резистентными к этим препаратам штаммами.

Не удивительно, что последние два десятилетия ознаменовались созданием целой серии антибактериальных химиопрепаратов фторхинолонового ряда (в табл. 1 приведены структуры клинически наиболее важных фторхинолонов), что позволило говорить о начале новой эры в химиотерапии бактериальных инфекций.

Действительно, современный арсенал терапевтических средств борьбы с бактериальными инфекциями уже трудно представить без впечатляющего семейства фторхинолоновых препаратов. Наиболее известными представителями фторхинолонов являются левофлоксацин, прулифлоксацин, моксифлоксацин, пазуфлоксацин, цiproфлоксацин, спарфлоксацин, гемифлоксацин, гатифлоксацин [4–25].

Таблица 1

Клинически важные фторхинолоны

<p>Налидиксовая кислота</p>	<p>Эноксацин</p>
<p>Норфлоксацин</p>	<p>Пефлоксацин</p>
<p>Ломефлоксацин</p>	<p>Цiproфлоксацин</p>

Продолжение табл. 1

<p>Грепафлоксацин</p>	<p>Гатифлоксацин</p>
<p>Спарфлоксацин</p>	<p>Моксифлоксацин</p>
<p>Тровафлоксацин</p>	<p>Гемифлоксацин</p>
<p>Офлоксацин</p>	<p>Левафлоксацин</p>

На протяжении многих лет они изучаются научными коллективами академических институтов, университетов и фармацевтических фирм, о чем свидетельствуют многочисленные обзоры и монографии [9, 14, 16, 26–53].

Неоднократно предпринимались попытки применить к классификации фторхинолонов подход, основанный на выделении нескольких поколений, некоторые из предложенных схем классификации приведены в табл. 2 [54]. Однако ни одна из этих схем не стала общепризнанной,

тем не менее, несмотря на условность разделения, можно выделить группы соединений, относящихся к одному и тому же поколению во всех трех схемах.

Таблица 2

Авторы и предложенные ими варианты классификации хинолонов

P. Ball [55]	V.T. Andriole [56]	F. Van Bambeke [57]
I поколение	I поколение	I поколение
Налидиксовая кислота	Налидиксовая кислота	Налидиксовая кислота
IIa поколение	Циноксацин	IIa поколение
Эноксацин	II поколение	Норфлоксацин
Ципрофлоксацин	Норфлоксацин	Ципрофлоксацин
Офлоксацин	Ципрофлоксацин	Ломефлоксацин
Левифлоксацин	Ломефлоксацин	Офлоксацин
IIb поколение	Офлоксацин	Левифлоксацин
Спарфлоксацин	Левифлоксацин	IIb поколение
Грепафлоксацин	III поколение	Спарфлоксацин
Тосуфлоксацин	Спарфлоксацин	Грепафлоксацин
IIIa поколение	Гатифлоксацин	IIIa поколение
Моксифлоксацин	Грепафлоксацин	Гатифлоксацин
Гатифлоксацин	IV поколение	Тровафлоксацин
Спарфлоксацин	Тровафлоксацин	Моксифлоксацин
Клинафлоксацин	Моксифлоксацин	IIIb поколение
Тровафлоксацин	Гемифлоксацин	Гемифлоксацин
IIIb поколение		IV поколение
Гемифлоксацин		Гареноксацин

Фторхинолоны первого поколения, к которому все авторы отнесли налидиксовую кислоту, проявляли активность к грамотрицательным *Enterobacteriaceae*. Налидиксовую кислоту применяли только для лечения мочевыводящих путей, но по мере совершенствования химической структуры хинолонов области клинического применения их существенно расширились и этот процесс продолжается.

В ряду фторхинолонов второго поколения различают группу препаратов, активных в отношении грамотрицательных микроорганизмов, *E. coli* и *P. aeruginosa*, а также группу препаратов с широким спектром активности (норфлоксацин, пефлоксацин, эноксацин,

флероксацин, ломефлоксацин, цiproфлоксацин, офлоксацин, руфлоксацин, надифлоксацин). Норфлоксацин, офлоксацин и цiproфлоксацин имеют огромное значение для лечения урологических заболеваний, инфекций желудочно-кишечного тракта, а также заболеваний, передающихся половым путем. Фторхинолоны третьего поколения (левофлоксацин, пазуфлоксацин, спарфлоксацин, клинафлоксацин, ситафлоксацин, тровафлоксацин, тосуфлоксацин, темафлоксацин, грепафлоксацин, бафлоксацин, моксифлоксацин, гатифлоксацин) проявляют более высокую активность по отношению к грамположительным коккам (особенно клинафлоксацин, ситафлоксацин, тровафлоксацин в отношении *S. pneumoniae*). Кроме того, третье поколение фторхинолонов подавляет грамотрицательные *H. influenzae* и *L. pneumophila*, активны в отношении анаэробных и атипичных возбудителей [58]. Моксифлоксацин и гатифлоксацин активны в отношении цiproфлоксацин-резистентных и левофлоксацин-резистентных штаммов пневмококков, а также метициллин-резистентных и макролид-резистентных стафилококков. Левофлоксацин, моксифлоксацин и гатифлоксацин нашли широкое применение для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей, таких как пневмония, синусит, фарингит, инфекций кожи и мягких тканей, вызванных грамположительными штаммами стафилококков, пневмококков, стрептококков, андентерококков. В последние годы фторхинолоны все шире применяются для лечения туберкулеза [8, 50, 59–63].

Первые фторхинолоны ингибировали топоизомеразу II (ДНК-гиразу), что приводило к блокированию синтеза РНК на матрице ДНК и к гибели клеток, причем специфическое действие фторхинолонов на бактерии заключается в том, что они **ингибируют ДНК-гиразу бактерий, но не связываются с ДНК-топоизомеразами клеток хозяина** [64]. На рис. 1 представлена схема ингибирования ДНК-гиказы фторхинолоном. Интересно отметить, что резистентность бактерий к хинолонам часто связана с повреждением субъединицы А ДНК-гиказы. Все описанные до настоящего времени ДНК-гиказы различных бактерий являются тетрамерами, состоящими из двух субъединиц А и двух субъединиц В.

В работе [65] методами SAR и QSAR проанализировано биологическое действие фторхинолонов и предложена модель взаимодействия ДНК-гиказы с хинолон-3-карбоксамидом (рис. 2). Рассмотрено большое количество факторов и отмечено, что ключевыми являются π -стэкинговое взаимодействие гетероциклических ядер и взаимодействие атома азота амидной группы с рецептором [66].

Механизм действия фторхинолонов на ферменты различных бактерий продолжает оставаться объектом исследований [67, 68]. Дополнительный стимул к детальному изучению механизма в последние годы связан еще и с тем, что сигнальная молекула, индуцирующая образование гена *lasB*, имеет структуру замещенного 4-хинолона [69].

Рис. 1. Ингибирование ДНК-гиразы фторхинолонами

Рис. 2. Предполагаемая модель взаимодействия ДНК-гиразы и N-замещенного хиолин-4(1H)-он-3-карбоксамид

В настоящее время в зависимости от блокируемого фермента бактерий различают три типа фторхинолонов:

- фторхинолоны первого типа (норфлоксацин, энноксацин, флероксацин, ципрофлоксацин, ломефлоксацин, тровафлоксацин, грепафлоксацин, офлоксацин и левофлоксацин) предпочтительно ингибируют топоизомеразу IV;

- фторхинолоны второго типа (надифлоксацин и спарфлоксацин) предпочтительно ингибируют ДНК-гиразу;

- фторхинолоны третьего типа (гатифлоксацин, пазуфлоксацин, моксифлоксацин, клинафлоксацин) оказывают двойное действие: они ингибируют и топоизомеразу IV, и ДНК-гиразу [70–72].

Важным свойством фторхинолонов является избирательность их действия: подавляя в бактерицидных концентрациях активность бактериальной ДНК-гиразы, они не влияют на связанные с ДНК процессы клеток млекопитающих [73]. Хинолоны не убивают бактерии ингибированием критических клеточных процессов. Скорее они нарушают действие двух существенных ферментов, ДНК-гиразы и топоизомеразы IV, и побуждают их убивать клетки, вызывая разрыв двухспиральной ДНК [1].

Ведущие фармацевтические фирмы уже создали и ввели в медицинскую практику большую группу препаратов этого класса:

- 1980–1985 гг. — норфлоксацин, пефлоксацин, цiproфлоксацин, офлоксацин, эноксацин, амифлоксацин, дифлоксацин, ибафлоксацин, ирлоксацин;
- 1985–1990 гг. — ломефлоксацин, спарфлоксацин, флероксацин, тосуфлоксацин, темафлоксацин, левофлоксацин;
- 1991–1998 гг. — гепафлоксацин, гатифлоксацин, клинафлоксацин, моксифлоксацин, тровафлоксацин, энрофлоксацин, балофлоксацин, прулифлоксацин, пазифлоксацин, ипрофлоксацин, данофлоксацин [74].

Важное свойство фторхинолонов — их оптимальная фармакокинетика, обеспечивающая высокую степень биодоступности при применении внутрь и одновременно высокие тканевые и внутриклеточные концентрации, что позволяет добиться высокой клинической эффективности в случаях тяжелых форм заболевания при назначении препаратов только перорально [74].

Фторхинолоны, применяемые в медицинской практике, хорошо переносятся взрослыми больными даже при длительных курсах лечения, эти препараты не оказывают гепато-, нефро- и ототоксического действия. Однако в числе нежелательных реакций следует отметить некоторые побочные эффекты: фототоксичность (под влиянием УФ-лучей возможна фотодеструкция молекулы фторхинолона, индукция свободных радикалов и повреждение кожных структур); возможные судорожные реакции, связанные с ингибированием рецепторов ГАМК; подавление метаболизма ксантинов и метилксантинов. Темафлоксацин вызывает у ряда больных почечную недостаточность, гемодинамические расстройства, тромбообразование. Кроме того, имеется потенциальная возможность артротоксических эффектов и нарушений нормального развития хрящевой ткани. Фторхинолоны настолько эффективны при тяжелых инфекциях, что норфлоксацин, имеющий наибольший по времени опыт клинического применения в клиниках Японии, уже разрешен в этой стране для применения в педиатрии [74].

Большинство фторхинолонов, вошедших в медицинскую практику, имеют в своей основе бициклическую систему 4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты. Аннелирование карбо- и гетероциклов к хинолоновому остову приводит в ряде случаев не только к повышению антибактериальной активности [75], но и к появлению других

видов активности, в том числе противовирусной [76–78] и противоопухолевой [76, 79, 80]. В ряду полициклических фторхинолонов наиболее известными представителями являются офлоксацин и левофлоксацин [37, 81, 82].

Список литературы

1. *Anderson V. E., Osheroff N.* // *Cur. Pharm. Des.* 2001. V. 7. P. 339–353.
2. *Sissi C., Palumbo M.* // *Curr. Med. Chem. — Anti-Cancer Agents.* 2003. V. 3. P. 439–452.
3. *Li Q., Mitscher L. A., Shen L. L.* // *Inc. Med. Res. Rev.* 2000. V. 20. P. 231–246.
4. *Xie F., Feng Y., Hu X. et al.* // *Zhongguo Xinyao Zazhi.* 2005. V. 14, № 9. P. 1198–1201.
5. *Chen Z. Y. Y.* // *Yanke Yanjiu.* 2005. V. 23(6). P. 656–659.
6. *Shen Q., Liang D., Miao J.* // *Huaxi Yixue.* 2005. V. 20, № 4. P. 804–805.
7. *Ravikumar K., Sridhar B.* // *Acta Crystallogr. C.* 2006. V. 62, № 8. P. 478–482.
8. *Shandil R. K., Jayaram R., Kaur P. et al.* // *Antimicrob. Agents Chemother.* 2007. V. 51, № 2. P. 576–582.
9. *Keam S.J., Perry C.M.* // *Drugs.* 2004. V. 64, № 19. P. 2221–2234.
10. *Miravittles M.* // *Exp. Opin. Pharm.* 2005. V. 6, № 2. P. 283–293.
11. *Sethi S.* // *Clin. Infect. Dis.* 2005. V. 41, № 2. P. 177–185.
12. *Kresken M., Lode H. C.* // *Chemother. J.* 2005. V. 14, № 1. P. 22–26.
13. *Patou G., Tillotson G., Blondeau J.* // *Therapy.* 2005. V. 2, № 3. P. 357–373.
14. *Keam S. J., Croom K. F., Keating G. M.* // *Drugs.* 2005. V. 65, № 5. P. 695–724.
15. *Keating G. M., Scott L. J.* // *Drugs.* 2004. V. 64, № 20. P. 2347–2377.
16. *File T. M., Tillotson G. S.* // *Exp. Rev. Anti-Inf. Therapy.* 2004. V. 2, № 6. P. 831–843.
17. *Ball P., Stahlmann R., Kubin R. et al.* // *Clin. Therapy.* 2004. V. 26, № 7. P. 940–950.
18. *Montanari M. P., Ferrante L., Tili E. et al.* // *J. Chemother.* 2005. V. 17, № 2. P. 138–142.
19. *Bhavnani S. M., Andes D. R.* // *Pharmacotherapy.* 2005. V. 25, № 5. P. 717–740.
20. *Madan A. K.* // *Clin. Therapy.* 2004. V. 26, № 10. P. 1564–1577.
21. *Carratala J., Martin-Herrero J. E., Mykietiuik A., Garcia-Rey C.* // *Clin. Microbiol. Inf.* 2006. V. 12, № 3. P. 2–11.
22. *Prats G., Rossi V., Salvatori E., Mirelis B.* // *Exp. Rev. Anti-Inf. Therapy.* 2006. V. 4, № 1. P. 27–41.
23. *Cazzola M., Salvatori E., Dionisio P., Allegra L.* // *Pulm. Pharm. Therapy.* 2006. V. 19, № 1. P. 30–37.
24. *Matera M.G.* // *Pulm. Pharm. Therapy.* 2006. V. 19, № 1. P. 20–29.
25. *De Souza M. V. N., de Almeida M. V., de Silva A. D., Couri M. R. C.* // *Rev. Brasileira de Farmacia.* 2005. V. 85, № 1. P. 13–18.

26. The Quinolones / Ed. T. V. Andriole. — New York: Academic Press, 1988. — 262 p.
27. Quinolone antimicrobial agents / Eds J. S. Wolfson, D. C. Hooper. — Washington: American Society for Microbiology, 1989. — 290 p.
28. *Bouzard D.* Recent Progress in the chemical synthesis of antibiotics. — Berlin: Springer-Verlag, 1990. — P. 249–283.
29. The new Generation of Quinolones / Eds. C. Siporin, C. L. Heifetz, J. M. Damaglia. — New-York: Marcel Dekker Inc., 1990. — 422 p.
30. *Мокрушина Г. А., Алексеев С. Г., Чарушин В. Н., Чупахин О. Н.* // Журн. Всесоюз. хим. общ-ва им. Д.И. Менделеева. 1991. Т. 36. С. 447–455.
31. *Chu D. T. W., Fernandes P. B.* Advances in Drug Research. V. 21 / Ed. V. Testa. — New-York: Academic Press, 1991. — P. 39–144.
32. *Shen L. L.* Quinolone Antibacterial Agents. — Washington: American Society for Microbiology, 1993. — 89 p.
33. Quinolone Antibacterial Agents / Eds. D. C. Hooper., E. Rubinstein. — Washington: ASM Press, 2003. — 485 p.
34. *Падейская Е. Н., Яковлев В. П.* Фторхинолоны. — М.: Биоинформ, 1995. — 220 с.
35. *Мокрушина Г. А., Чарушин В. Н., Чупахин О. Н.* // Хим.-фарм. журн. 1993. Т. 27, № 5. С. 5–19.
36. The Quinolones. 2nd ed. / Ed. T. V. Andriole. — New-York: Academic Press, 1998. — 441 p.
37. *Мокрушина Г. А., Носова Э. В., Липунова Г. Н., Чарушин В.Н.* // Журн. орган. химии. 1999. Т. 35, № 10. С. 1447–1463.
38. *Shams W. E., Evans M. E.* // Drugs. 2005. V. 65, № 7. P. 949–991.
39. *De Souza M. V. N.* // Mini-Rev. Med. Chem. 2005. V. 5, № 11. P. 1009–1017.
40. *Bryskier A., Lowther J.* Fluroquinolones and tuberculosis / Ed. A. Bryskier. — Washington: American Society for Microbiology, 2005. — P. 1124–1145.
41. *Melhus A.* // Exp. Opin. Drugs Safety. 2005. V. 4, № 2. P. 299–309.
42. *Zhanel G. G., Fontaine S., Adam H. et al.* // Treatm. Resp. Med. 2006. V. 5, № 6. P. 437–465.
43. *Velissariou I. M.* // Exp. Rev. Anti-Inf. Therapy. 2006. V. 4, № 5. P. 853–860.
44. *Anquetin G., Greiner J., Mahmoudi N. et al.* // Eur. J. Med. Chem. 2006. V. 41, № 12. P. 1478–1493.
45. *Laloo U. G., Naidoo R., Ambaram A.* // Cur. Opin. Pulm. Med. 2006. V. 12, № 3. P. 9–185.
46. *Wagenlehner F. M. E., Naber K. G.* // Clin. Microb. Inf. 2006. V. 12, № 3. P. 67–80.
47. *De Souza M. V. N., Vasconcelos T. R. A., De Almeida M. V., Cardoso S. H.* // Cur. Med. Chem. 2006. V. 13, № 4. P. 455–463.
48. *Arguedas A., Sierra H., Soley C.* // Cur. Drug Therapy. 2006. V. 1, № 1. P. 117–125.
49. *Blasi F., Tarsia P., Aliberti S. et al.* // Pulm. Pharm. Therapy. 2006. V. 19, № 1. P. 11–19.

50. Conde M. B., Villarino M. E. // *Cur. Resp. Med. Rev.* 2007. V. 3, № 2. P. 101–106.
51. Murphy S. T., Case H. L., Ellsworth E. et al. // *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 2007. V. 17, № 8. P. 2150–2155.
52. Rinaldo C. H., Hirsch H. H. // *Exp. Rev. Anti-Inf. Therapy.* 2007. V. 5, № 1. P. 105–115.
53. Ботева А. А., Красных О. П. // *Химия гетероцикл. соедин.* 2009. Т. 7. С. 963–997.
54. Сидоренко С.В. // *Антибиотики и химиотер.* 2006. Т. 51, № 1. С. 28–37.
55. Ball P. // *Antimicrob. Chemother.* 2000. V. 46. P. 17–24.
56. Andriole V. T. // *Clin. Infect. Dis.* 2005. V. 41. P. 113–119.
57. Van Bambeke F., Michot J. M., Van Eldere J., Tulkens P. M. // *Clin. Microbiol. Infect.* 2005. V. 11. P. 256–280.
58. Ball P. *The Quinolones* / Ed. T. V. Andriole. — San Francisco: Academic Press, 1998. — P. 1–28.
59. Jacobs M. R. // *Cur. Pharm. Design.* 2004. V. 10, № 26. P. 3213–3220.
60. Duncan K., Barry C. E. // *Cur. Opin. Microbiol.* 2004. V. 7, № 5. P. 460–465.
61. Nalid P., Pai M., Hopewell P. C. // *Proceed. Am. Thor. Soc.* 2006. V. 3, № 1. P. 103–110.
62. Biava M., Porretta G. C., Deidda D., Pompei R. // *Inf. Disord. Drug Targets.* 2006. V. 6, № 2. P. 159–172.
63. Smith K. C., Seaworth B. J. // *Exp. Rev. Anti-Infec. Therapy.* 2005. V. 3, № 6. P. 995–1010.
64. Фадеева Н. И., Шульгина М. В., Глушков Г. Г. // *Хим.-фарм. журн.* 1993. Т. 27, № 5. С. 4–9.
65. Llorente B., Lecterc F., Cedergren R. // *Bioorg. Med. Chem.* 1996. V. 4. P. 61–71.
66. Srivastava S. K., Chauhan P. M. S., Bhaduri A. P. et al. // *J. Med. Chem.* 2000. V. 43, № 11. P. 2275–2279.
67. Yang Y. L., Lauderdale T. L., Lo H. J. // *Cur. Drug Targets. Inf. Disord.* 2004. V. 4, № 4. P. 295–302.
68. Tunitskaya V. L., Khomutov A. P., Kochetkov S. N. et al. // *Acta Naturae.* 2011. V. 3, № 4. P. 98–104.
69. Huse H., Whiteley M. // *Chem. Rev.* 2011. V. 111. P. 152–159.
70. Takei M. // *Antimicrob. Agents Chemoter.* 2000. V. 45. P. 3544–3549.
71. Международная заявка № 68229 / М. V. Patel, S. V. Gupte, Y. Chugh et al. // *Chem. Abstr.* 2000. V. 133. 350154.
72. Международная заявка № 85728 / N. J. De Souza, M. V. Patci, S. K. Agarwal et al. // *Chem. Abstr.* 2001. V. 135. 371572.
73. Petersen U., Bartel S., Bremm K. D. et al. // *Bull. Soc. Chim. Belg.* 1996. V. 105, № 10–11. P. 683–699.
74. Падейская Е. Н. // *Антибиотики и химиотер.* 1998. Т. 43, № 11. С. 38–43.
75. Taguchi M., Kondo H., Inoue Y. et al. // *J. Med. Chem.* 1992. V. 35, № 1. P. 94–99.
76. Европейский патент № 563734 / S. Schneider, M. Ruppert, M. Schriewer et al. // *Chem. Abstr.* 1994. V. 120. 134497.

-
77. Европейский патент № 563732 / S. Schneider, S. Bartel, M. Ruppelt et al. // Chem. Abstr. 1994. V. 120. 164227.
 78. Патент Японии № 69339 / Т. К. Kokai // Chem. Abstr. 1986. V. 104. 31232.
 79. Патент Японии № 223289 / К. Chiba, К. Yamamoto, К. Miyamomoto et al. // Chem. Abstr. 1992. V. 116. 59403.
 80. *Chu D. T. W., Hallas R., Clement J. J. et al.* // Drugs Expl. Clin. Res. 1992. V. 18, № 7. P. 275.
 81. *Hayakawa I., Hiramitsu T., Tanaka Y.* // Chem. Pharm. Bull. 1984. V. 32, № 12. P. 4907–4909.
 82. *Hayakawa I., Atarashi S., Yokohama S.* // Antimicrob. Agents Chemoter. 1986. V. 29, № 1. P. 163–167.

СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ БИЦИКЛИЧЕСКИХ ФТОРХИНОЛОНОВ

1.1. Методы построения фторхинолонового остова

Для синтеза хинолин-4-он-3-карбоновых кислот разработаны два принципиальных подхода [1, 2]. Первый основан на использовании фторированных анилинов (**1.1**, A = CH, CF) или 2-аминопиридинов (**1.1**, A = N) в качестве исходных соединений и состоит в конденсации их с этоксиметиленмалонатом, цианоацетатом или ацетоацетатом с образованием енаминов **1.2**. Внутримолекулярная циклизация соединений **1.2** под действием полифосфорной кислоты (PPA) (реакция Гоулда–Джекобса) приводит к образованию соответствующих фторхинолонов (**1.3**, A = CH, CF) или нафтиридонов (**1.3**, A = N) (схема 1.1) [3–9]. Алкилирование фторхинолонов (**1.3**, R = H) обычно проводят алкилбромидом в присутствии K₂CO₃ в этилацетате, содержащем триэтиламин [10].

Схема 1.1

A = CH, CX, N; Y, Z = CO₂R, CN, COMe; R = Alk, циклопропил

Второй подход предполагает использование фторсодержащих бензоильных производных (**1.4**, A = CF, CH) или их никотиноильных аналогов (**1.4**, A = N) в качестве строительных блоков, ключевыми интермедиатами в данном случае являются бензоил- или пиридиноилакрилаты **1.6** (схема 1.2) [11–20]. Циклизацию енаминов **1.7** осуществляют нагреванием в ДМФА в присутствии карбоната калия, в этилацетате в присутствии гидроксида натрия [21, 22] или других основных условиях [2, 23, 24].

Схема 1.2

В настоящее время продолжают исследования, направленные на усовершенствование методов построения бициклических фторхинолонов, повышение выхода фторхинолонов и качества продукта, уменьшение количества стадий, удешевление синтеза [25–37]. Ряд исследований посвящен разработке новых методов построения фторхинолонового остова и нацелен на получение оригинальных соединений с антибактериальной активностью.

Предложено проведение конденсации 3-хлор-4-фторанилина с этоксиметиленмалоновым эфиром в условиях микроволнового излучения [38].

Реакция Гоулда–Джекобса малонатов **1.10** в дифениловом эфире подробно рассмотрена в работе [39] (схема 1.3).

Схема 1.3

Ранее для циклизации 3,4-дигалогенанилинометиленмалоновой кислоты (**1.2**, A = CH, X = Cl, F, R = H, Y = Z = COOEt) в соответствующий этиловый эфир 6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновой кислоты **1.3** часто использовали даутерм или дифениловый эфир [40], однако дифениловый эфир опасен для окружающей среды вследствие своей токсичности. В работе [41] стадию циклизации предлагается проводить в среде хлорсульфоновоы кислоты или олеума при температуре 70–90 °С в течение 0,5–3 ч. В результате с выходом 99 % получают смесь 1-этил-1,4-дигидро-4-оксо-5-хлор-6-фтор-3-хинолинкарбоновой кислоты и 1-этил-1,4-дигидро-4-оксо-6-фтор-7-фтор-3-хинолинкарбоновой кислоты (соотношение 60/40). 5-Хлор-изомер не обладает антибактериальной активностью и загрязняет целевой продукт, процесс разделения изомеров оказывается сложным. Работы [36, 37, 42] посвящены циклизации 3-фтор(хлор)-4-фторанилинометиленмалоната в среде высших алканов (C₁₂–C₁₈) или дешевых высококипящих фракций продуктов нефтеперегонки. Однако высококипящие фракции продуктов нефтеперегонки содержат в своем составе ароматические, непредельные и разветвленные углеводороды, которые в условиях циклизации подвержены осмолению. Авторами [27] было предложено проводить циклизацию диэтилового эфира 3-хлор-4-фторанилинометиленмалоновой кислоты в летнем дизельном топливе в качестве растворителя при температуре 230–245 °С в течение 1 ч. Такое топливо является товарным многотоннажным продуктом переработки нефти, не содержит примесей, вызывающих осмоление при температурном режиме реакции, дешевле индивидуальных углеводородов C₁₂–C₁₈. Его применение позволяет упростить технологический процесс, повысить экономическую эффективность, увеличить чистоту продукта циклизации, являющегося промежуточным продуктом в синтезе высокоэффективных антибактериальных ветеринарных препаратов широкого спектра действия. О циклизации интермедиата **1.10** в нитробензоле, содержащем P₂O₅, сообщается в работе [43].

Для получения *ципрофлоксацина* было предложено использовать 3-хлор-4-фторанилин и 1-этокси-1-(триметилсилилокси)циклопропан в качестве ключевых синтонов [44]. Удобный способ получения 1-этилфторхинолонов, основанный на взаимодействии N-этиланилина с диэтилэтоксиметиленмалонатом, предложен в работе [45]. Авторами [46, 47] для построения фторхинолонов был использован N-формил-N-этил-3-хлор-4-фторанилин.

3-Бензоксазол-2-ил-4-фторфениламин (**1.14**, X = O) и 3-бензотиазол-2-ил-4-фторфениламин (**1.14**, X = S), полученные циклоконденсацией 5-амино-2-фторбензойной кислоты **1.13** с 2-аминофенолом или 2-аминотиофенолом в полифосфорной кислоте, применены для синтеза 7-бензоксазол- и 7-бензтиазол-замещенных фторхинолонов **1.15** с использованием реакции Гоулда–Джекобса (схема 1.4) [48].

Схема 1.4

1,4-Дигидро-4-оксохинолин-3-карбоновые кислоты, не имеющие атома фтора в положении 6 и содержащие в положении 7 4-метилпиперидинильный остаток, также были получены по реакции Гоулда-Джекобса [49].

Новый подход к синтезу *норфлоксацина* предложен в патенте [50] (схема 1.5). На первой стадии осуществляют реакцию 3-хлор-4-фторанилина **1.16** с 2,2-диметил-5-этоксиметил-1,3-диоксан-4,6-дионом, после циклизации интермедиата **1.17** проводят гидроксиметилирование, N-алкилирование, окисление группы CH_2OH и замещение атома Cl(7) на остаток пиперазина.

Схема 1.5

N-Фенилдиоксопирролин **1.23** был синтезирован конденсацией енамина **1.22**, полученного присоединением 3,4-дифторанилина **1.9g** к диметилацетилендикарбоксилату, с оксалилхлоридом. 6,7-Дифторхинолонкарбоновая кислота **1.26** получена в результате пиролиза **1.23** с последующим гидролизом и декарбоксилированием (схема 1.6) [51].

Схема 1.6

Много исследований посвящено модификации методов построения фторхинолонов из фторсодержащих бензойных кислот. Так, в синтезе 1-циклопропил-1,4-дигидро-4-оксо-6-фтор-7-хлор-1,8-нафтиридин-4-карбоновой кислоты предпринята удачная попытка осуществить четыре стадии без выделения промежуточных продуктов [52]. Раствор этилового эфира (2,6-дихлор-5-фторпиридин-3-ил)уксусной кислоты в толуоле обрабатывают (MeO)₂CHNMe₂ и уксусной кислотой в течение 50 мин, затем добавляют циклопропиламин и перемешивают реакционную массу при 25–35 °С еще 50 мин. Смесь промывают раствором лимонной кислоты, водой, обрабатывают тетрабутиламмонийбромидом и 25 %-м раствором NaOH, перемешивают 2 ч, кипятят с 35 %-м раствором HCl в течение 8 ч; после фильтрации и промывки водой и изопропанолом получают с высоким выходом 1-циклопропил-1,4-дигидро-4-оксо-6-фтор-7-хлор-1,8-нафтиридин-4-карбоновую кислоту. В работе [53] предложен способ получения гатифлоксацина без выделения промежуточных продуктов.

Интермедиат в синтезе нафтиридинкарбоновых кислот — этиловый эфир (2,6-дихлор-5-фторпиридин-3-ил)уксусной кислоты — был получен с высоким выходом нагреванием 2,6-дихлор-5-фтор-3-пиридинкарбонитрида с цинковой пылью и MeSO₃H в ТГФ с последующей обработкой BrCH₂COOEt [54]. Однореакторный способ синтеза эфира 2,6-дихлор-5-фторникотиновой кислоты описан в патенте [55].

В качестве бензоилгалогенидов **1.4** для построения фторхинолонов могут быть использованы 3,5-дихлор-2,4-дифторбензоилфторид или 5-хлор-2,3,4-трифторбензоилфторид, синтезированные при нагревании тетрахлорбензоилхлорида с KF в сульфолане, либо 3-хлор-2,4,5-трифторбензоилхлорид, полученный хлорированием 2,4,5-трифторбензойной кислоты хлорсульфоновой кислотой и последующей обработкой 3-хлор-2,4,5-трифторбензойной кислоты тионилхлоридом [56]. Для циклизации интермедиата **1.7** в этой работе использованы фторид натрия, гидроксиды щелочных металлов, карбонаты щелочных металлов, органические амиды и амидины, триэтиламин, 1,4-диазабицикло[2.2.2]октан (DABCO) или 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ен (DBU).

Предложено осуществлять циклизацию интермедиатов (**1.7**, $R^1 =$ = циклопропил, 2,4-дифторфенил, 1-ацетокси-2(*S*)-ил; X, Y = H, Cl, F; A = CH, CF, CNO₂, N) в производные хинолона **1.8** в ацетонитриле в присутствии K₃PO₄ при 75–80 °C в течение 1,5 ч [57].

Синтез ципрофлоксацина на основе 3-циклопропиламино-2-хлор-5-фтор-4-(4-этоксикарбонил-1-пиперазинил)бензоилэтилакрилата осуществлен авторами [58].

Ключевой стадией в синтезе *дифлоксацина* и *темафлоксацина* является взаимодействие 2,4-дихлор-5-фторацетофенона с диэтилоксалатом [59].

1-Циклопропил-6-фторхинолонкарбоновые кислоты **1.32** могут быть синтезированы через промежуточное образование 2,4-дихлор-5-фторбензоилацетонитрила **1.30** (схема 1.7) [60].

Синтез фторхинолонов может осуществляться также на основе фторсодержащих ацетофенонов [61, 62]. Например, оксалилированием 2,4-дихлор-5-фторацетофенона с последующим этоксиметиленированием, аминированием, циклизацией, гидролизом, декарбонилированием и замещением хлора на пиперазин получен ципрофлоксацин [63].

В работе [64] для циклизации интермедиата **1.36** в хинолон **1.37** использован силилирующий агент. В результате реакции типа Кневенегеля 2,4-дифтор-3-метоксиацетофенона **1.33** с искусным ангидридом образуется смесь эфиров (**1.34**, $R = \text{F}$) и (**1.34**, $R = \text{OEt}$), которая была превращена в смесь (**1.35**, $R = \text{F}$) и (**1.35**, $R = \text{OEt}$). После взаимодействия с циклопропиламином гетероциклизация смеси (**1.36**, $R = \text{F}$) и (**1.36**, $R = \text{OEt}$) осуществлена с применением $\text{Me}_3\text{Si}-\text{N}=\text{C}(\text{Me})-\text{OSiMe}_3$ (схема 1.8).

Авторами [65] предложено получение целевого енаминона **1.40** действием этилового эфира *N,N*-диметиламиноакриловой кислоты

на хлорангидрид 2,4-дифтор-3-метоксибензойной кислоты **1.38** и последующей реакцией 3-диметиламино-2-(2,4-дифтор-3-метоксибензоил)акрилата **1.39** с (1*R*,2*S*)-2-фторциклопропиламином (схема 1.9).

В синтезе 8-нитрозамещенных аналогов ципрофлоксацина также была использована реакция этилового эфира 3-диметиламиноакриловой кислоты с 2,4-дихлор-5-фтор-3-нитробензоилхлоридом [66]. Синтез других фторхинолонов на основе 2,4,5-трифторбензоилхлорида и этилового эфира 3-диметиламиноакриловой кислоты был реализован в каскадном микрореакторе [67].

При нагревании енаминонов, синтезированных из 1,3-дикарбонильных соединений и первичных аминов, с 2,4,5-трифторбензоилхлоридом **1.42** в толуоле в присутствии триэтиламина и дополнительного нагревания после добавления в реакционную массу DBU образуются хинолоны **1.43**, выход которых после выделения с помощью колоночной хроматографии составил 10–41 % (схема 1.10) [68].

Схема 1.10

Используя средство тетрабензо[*f,c,g,i*]флуорена к активированному углю, реализован твердофазный синтез ципрофлоксацина на основе 2,4,5-трифторбензоилуксусного эфира **1.44** и **1.45** (схема 1.11) [69].

Схема 1.11

Построение фторхинолонового остова можно осуществить внутри-молекулярной циклизацией динитрозамещенного енамина **1.46**, протекающей с замещением нитрогруппы; последующим введением атома фтора в положение 7 также путем замещения нитрогруппы при нагревании **1.47** с фторидом калия (схема 1.12) [70].

Схема 1.12

Синтез фторхинолонов через промежуточное образование аллиловых эфиров с последующим деаллилированием в присутствии Pd описан в работе [71].

Одной из задач при разработке методов синтеза фторхинолонов является создание экологически чистых технологий и исключение вредных растворителей, таких как диметилформамид и другие. С этой целью была изучена реакция хлорпроизводного **1.49** с пиперазином в воде. Было отмечено образование побочного продукта — 6-пиперазинилпроизводного **1.51**, количество которого составляет 8–10 % (схема 1.13) [72].

1.2. Взаимосвязь структуры и антибактериальной активности

Исследователи постоянно работают над модификацией бициклических фторхинолонов с целью создания более активных препаратов. Много исследований посвящено изменению и расширению спектра биологической активности, созданию препаратов, устойчивых к резистентным штаммам.

Вопросы взаимосвязи структуры и антибактериальной активности фторхинолонов, синтезированных в 80-х и начале 90-х гг. XX века, ранее рассмотрены в обзоре [73]. В данном разделе описаны превращения фторхинолонов, протекающие с сохранением 4-хинолонового фрагмента, проанализировано влияние вводимых в различные положения заместителей на антибактериальную активность.

1.2.1. Модификация положения N(1). Атом азота в положении 1 фторхинолонов играет важную роль в проявлении антибактериальной активности. Замена азота на углерод и кислород в аналогах оксолиновой кислоты полностью дезактивирует молекулу хинолона [74, 75]. Активность 1-тиоаналогов ломефлоксацина сравнима с налидиксовой кислотой [76].

Модификация N-незамещенных фторхинолонов заключается во введении алкильных заместителей реакцией с соответствующим алкилгалогенидом в присутствии поташа, гидроксида натрия или гидроксида калия. Первые представители коммерческих фторхинолонов содержали у N(1) этильную группировку — *ноर्फлоксацин*, *пемфлоксацин*, *эноксацин*, фторэтильную — *флероксацин* или метиламиногруппу — *амифлоксацин*. Изучение активности серии аналогов эноксацина с C₁–C₅ алифатическими заместителями у N(1) подтвердило выводы о преимуществе этильной группировки, но не выявило каких-либо закономерностей (C₂H₅ > n-C₃H₇ > изо-C₃H₇ > n-C₄H₉ > C₅H₁₁ > > CH₃) [77].

1-Этилфторхинолоны получают либо этилированием 1*H*-фторхинолона [78–81], либо реакцией этиламина с 5-(метоксиметил)-2,2-диметил-1,3-диоксан-4,6-дионом (производным кислоты Мелдрума) и последующей циклизацией 5-([N-этил-N-(4-фторгалогенил)амино]-метил)-2,2-диметил-1,3-диоксан-4,6-диола [82].

Строение 1-этил-6-фтор-4-оксо-7-(4-метилпиперазинил)-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты — *пепфлоксацина* изучено методом рентгеноструктурного анализа (РСА) (рис. 1.1) [83].

Рис. 1.1. Данные РСА пепфлоксацина

Модификация этильной группы — замена водорода другим фрагментом (ОН, F, CF₃) оказалась оправданной лишь в случае введения атома фтора (*флероксацин*) [84]. Для синтеза аналога пепфлоксацина, содержащего CH₂CH₂F в положении 1, проводится алкилирование 1*H*-фторхинолона 1-бром-2-фторэтаном в присутствии диизопропилэтиламина и тетрабутиламмонийиодида при 110 °С [85].

Конформационно ограниченные аналоги флероксацина синтезированы по схеме 1.14. Активность *Z*-изомеров **1.54** в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий в 2–32 раза превышает активность *E*-изомеров **1.55** [86].

Изучено распределение в организме [¹⁸F]флероксацина [87].

Заменой этильной группы на NHCH₃, являющуюся ее стерическим аналогом, получен высокоэффективный препарат *амифлоксацин*. При испытаниях *in vitro* он не обладал значительными преимуществами перед норфлоксацином и пепфлоксацином, но продемонстрировал лучшие фармакокинетические свойства, будучи активным в равной степени при приеме orally и parenterally [88].

Фторхинолоны, содержащие в положении 1 (4-тиазолилметил)- и (2-метилтиазолил)метил, представлены в работах [89, 90].

Синтез 1-винильных производных фторхинолонов описан в работах [91, 92].

Действием на 1*H*-фторхинолон **1.56** пропаргилбромида в диметилсульфоксиде в присутствии карбоната калия было получено пропаргильное производное **1.57**, которое подвергли трансформации в пропацидиальное производное **1.58** обработкой NaHCO_3 (схема 1.15) [93, 94].

Разнообразие модификаций по положению 1 ограничивает тот факт, что для проявления хинолоном хорошей антибактериальной активности в данном положении должна быть относительно малая липофильная группа, например циклопропильная. Ряд важнейших фторхинолонов содержит циклопропильный заместитель в положении 1 (*ципрофлоксацин*, *эрофлоксацин*, *грепафлоксацин*, *клинафлоксацин*, *гatifлоксацин*, *моксифлоксацин*) [95–98].

Некоторые производные цiproфлоксацина изучены методом РСА. Так, на рис. 1.2 представлен комплекс сульфата магния с цiproфлоксацином, в котором сольватированный ион магния расположен между двумя протонированными по пиперазиновому циклу молекулами цiproфлоксацина [99].

Схема 1.14

Схема 1.15

Рис. 1.2. Данные PCA комплекса ципрофлоксацина и сульфата магния

В узких рядах соединений, где варьируется заместитель в положении 1, циклопропилпроизводные, как правило, более активны [100–103]. Введение метильной или фенильной групп в циклопропил, а также замена на циклобутил или циклопентенил снижает активность ципрофлоксацина (табл. 1.1) [104].

Несмотря на то что N-циклопентенил- и N-циклобутилфторхинолоны не проявили высокой антибактериальной активности [104], их бицикло[1.1.1.]пентилпроизводные (**1.59**, **1.60**) и содержащие кислородный аналог циклобутана (**1.61**, **1.62**) превосходят по активности *in vivo* ципрофлоксацин в отношении грамположительных микроорганизмов и анаэробов и резистентных к ципрофлоксацину штаммов *S. aureus* [105].

Наличие заместителей в циклопропиловом остатке приводит к образованию оптически активных изомеров, которые различаются по активности (например, 2-метилциклопропиловые производные в табл. 1.1) [104, 106]. В качестве примера можно привести и 1-(2-фторциклопропил)производные (табл. 1.2) [107].

Как видно из данных табл. 1.2 *цис*-аналоги более активны в отношении грамположительных штаммов бактерий, чем соответствующие

Таблица 1.1

Активность N(1)-замещенных производных фторхинолонов (МИС, мкг/мл)

R ₁	<i>S. aureus</i> A9537	<i>E. coli</i> A15119	<i>Ps. aer.</i> A9843
циклопропил (ципрофлоксацин)	0,13	0,03	0,13
2-метилциклопропил (<i>транс</i>)	1	0,06	2
2-метилциклопропил (<i>цис</i>)	0,13	0,13	1
2,2-диметилциклопропил	1	1	32
1- метилциклопропил	0,25	0,06	0,5
1-фенилциклопропил	0,13	0,13	4
циклобутил	0,5	0,13	1

R = NH₂ (**1.59**); CH₂NH₂ (**1.60**) R=4-метилпиперазинил (**1.61**);
3-метил-4-аминопирролидинил (**1.62**)

транс-изомеры, различия в отношении граммотрицательных штаммов меньше, *S*- и *R*-энантимеры незначительно отличаются по активности [107]. Аналогичные результаты были получены ранее для 1-(2-метил)- и 1-(2-фенил)циклопропильных замещенных [106, 108].

Для введения в положение 1 фторхинолона фторсодержащего циклопропильного остатка с определенной стереоконфигурацией широко используется (1*R*,2*S*)-2-фторциклопропиламин [109]. Так, в работе [110] предложено получать целевой енамин **1.65** действием этилового эфира *N,N*-диметиламиноакриловой кислоты на хлорангидрид 2,4-дифтор-3-метоксибензойной кислоты **1.63** и последующей реакцией 3-диметиламино-2-(2,4-дифтор-3-метоксибензоил)акрилата **1.64** с (1*R*,2*S*)-2-фторциклопропиламином (схема 1.16).

Таблица 1.2

Влияние стереоизомеров в циклопропильном заместителе на активность фторхинолонов (МИС, мкг/мл)

Изомер	R ⁷	<i>S. aureus</i>	<i>E. coli</i>	<i>Ps. aer</i>	<i>S. smith.</i>	<i>Klebs. pneum.</i>
<i>цис</i>	4-метил-пиперазин-1-ил	0,1	< 0,05	0,1	< 0,05	< 0,05
<i>транс</i>	4-метил-пиперазин-1-ил	1,56	< 0,05	0,78	1,56	0,2
<i>цис</i>	3-(<i>S</i>)-метил-пиперазин-1-ил	0,1	< 0,05	0,1	< 0,05	< 0,05
<i>транс</i>	3-(<i>S</i>)-метил-пиперазин-1-ил	1,56	< 0,05	0,30	0,78	0,1
<i>цис</i>	3-(<i>R</i>)-метил-пиперазин-1-ил	0,1	< 0,05	0,1	< 0,05	0,1
<i>транс</i>	3-(<i>R</i>)-метил-пиперазин-1-ил	1,56	< 0,05	0,78	0,78	0,2

Схема 1.16

Другая модификация 1-циклопропилфторхинолонов — введение остатка 1-R-циклопропана (R=OMe, CN, Alk и др.) путем взаимодействия 1*H*-фторхинолона с 1-R-замещенным циклопропилтрифлатом [111].

Фторхинолоны, содержащие в положении 1 замещенный бензильный фрагмент, синтезированы алкилированием этиловых эфиров 6,7-дифтор- или 6,7,8-трифтор-4-гидроксихинолин-3-карбоновой кислоты действием замещенного бензилхлорида с последующим замещением атома F(7) на остаток пиперазина или *N*-метилпиперазина и гидролизом сложноэфирной группировки. Наибольшую антибактериальную активность в ряду таких соединений проявили 6-фтор-1-(4-фторфенилметил)-1,4-дигидро-7-(1-пиперазинил)-4-оксохинолин-3-карбоновая кислота и 6,8-дифтор-1-(3-фторфенилметил)-1,4-дигидро-7-(1-пиперазинил)-4-оксохинолин-3-карбоновая кислота [112]. 1-Триазолилбензильное производное **1.67** также синтезировано реакцией алкилирования 1*H*-хинолона **1.56** (схема 1.17) [113].

Схема 1.17

Замещенные по положению 1 гетерилбутильным фрагментом производные пефлоксацина **1.68** и **1.69**, описанные в работе [114], представляют собой гибрид фторхинолона с пиримидиновыми и пуриновыми нуклеиновыми основаниями.

Показана возможность использования 1-*N*-замещенных 1-трифторметил-1,2-этилендиаминов для модификации положения 1. Фторхинолоны **1.71** получены нагреванием 3-этоксикарилата **1.70** с 1-*N*-замещенными 1-трифторметил-1,2-этилендиаминами в толуоле; в случае

хинолона **1.71a** реакцию проводили в присутствии N-метилморфолина в качестве реагента, связывающего HF (схема 1.18) [115].

Схема 1.18

1.71: R¹ = PhCO, R² = H (a); R¹ = PhCH₂, R² = H (б);
R¹ + R² = (CH₂)₂O(CH₂)₂ (в), R¹ + R² = (CH₂)₅ (г)

Исследование спектров ЯМР ¹⁹F соединений **1.71** позволило выявить дальние константы спин-спинового взаимодействия ⁷J_{F-F} между трифторметильной группировкой и атомом фтора в положении 8, осуществляемого через пространство вследствие геометрической близости взаимодействующих ядер.

Описана модификация положения 1 путем введения *трет*-бутильного заместителя. Реакция этилового эфира 7-хлор-6-фтор-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты **1.56** с *трет*-бутилбромидом в ДМФА в присутствии гидрида натрия приводит к N-*t*-бутильному производному **1.72** [116]. Другой подход к синтезу **1.72** основан на внутримолекулярной циклизации интермедиатов **1.73** (схема 1.19) [117].

Схема 1.19

Ранее [77] показана ошибочность выводов о том, что оптимальным алифатическим заместителем является этильная группа. Так, N(1)-*трет*-бутильные производные **1.74** обладают высокой