

Лапин Ю.А.

Кролики

ОПИСАНИЕ • РАЗВЕДЕНИЕ • УХОД

фермера



Школа



Юрий Александрович Лапин
Кролики
Серия «Урожайкины. Школа фермера»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5981790
Кролики / Юрий Лапин.: Эксмо; Москва; 2013
ISBN 978-5-699-60457-9

Аннотация

Всю исчерпывающую информацию о кроликах в подсобном хозяйстве вы найдете в этой книге. Узнаете историю, описание и назначение каждой породы, прочтете о том, как правильно выбрать, ухаживать, разводить и лечить этих пушистых зверьков, оборудовать место для их содержания, а также о способах и видах переработки продуктов кролиководства.

Содержание

Введение	4
Выбор кроликов	6
Породы кроликов	10
Мясо-шкурковые	10
Советская шиншилла	10
Белый великан	11
Серый великан	11
Серебристый	12
Золотистый	13
Венский голубой	14
Русский горностаевый	15
Советский мардер	16
Бабочка	17
Фландр	18
Ризен	18
Новозеландская красная	19
Черно-огненный	20
Черно-бурый	20
Тюрингенский	21
Рекс	21
Шампань	22
Беверен	23
Аляска	24
Мясные	25
Новозеландская белая	25
Калифорнийская	26
Бургундская	27
Декоративные	27
Бельгийский заяц	27
Немецкий пестрый великан	29
Голландская	29
Белка	30
Баран	30
Карликовый баран	31
Львиная голова	32
Гермелин	33
Определение типа конституции и оценка экстерьера	34
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Юрий Лапин

Кролики

Введение

Природой так устроено, что мясо кроликов является любимой и полезной пищей не только для человека, но и для большинства хищников. При такой любви это животное могло бы давно исчезнуть, но кролики обладают способностью быстро и часто размножаться, и так же быстро расти. Кролики появляются на свет в довольно короткие сроки. Сукрольность длится в среднем 30 дней, а затем крольчата начинают интенсивно расти и набирать вес. Условия содержания, безусловно, влияют на темпы роста и развития. При правильном уходе и хорошем кормлении крольчата уже к 4-м месяцам могут весить от 2-х до 4-х кг. По причине скороспелости кроликов их разведение – довольно выгодное занятие.

Существует несколько видов кролиководства. *Ретро-кролиководство*. В основе метода лежат простые приемы ведения хозяйства. При таком методе кроликов содержат большими группами, в которых нередко родственное скрещивание. Отрицательной стороной ретро-кролиководства является уменьшение производительности и гибель крольчат. Кормят кроликов кормами, общими для большинства видов сельскохозяйственных животных. При содержании могут не учитываться физиологические повадки кроликов, поэтому у них часто бывают желудочно-кишечные заболевания, наблюдается общее ослабление организма, что приводит к инфекционным болезням и гибели поголовья. Ретро-кролиководство не подходит для малого и среднего бизнеса, так как приносит больше убытков, чем прибыли. Да и для домашнего разведения этот метод также становится малопригодным и все больше уходит в прошлое.

Техническое кролиководство. Целью данного метода является производство продукции в промышленных масштабах. Для его осуществления необходимо строить крупные специализированные сооружения. Молодняк, как правило, стараются держать группами, что имеет отрицательные стороны. При помощи технических методов с применением гормональных стимуляторов производят сьем спермы у самцов и самок в основном оплодотворяют искусственно.

При таком оплодотворении удастся получить до 10 окролов в год, одна самка может принести в среднем 15–20 крольчат. Но такие методы заканчиваются существенным дефицитом маточного поголовья, так как нагрузка на организм крольчихи возрастает во много раз.


Для сокращения смертности используют плановые, антиинфекционные, противовирусные вакцинации. Для улучшения роста и стимуляции прибавки в весе кроликам вводят специальные гормональные препараты, которые носят допинговый характер. Чтобы придать мясу товарный вид, нередко применяют красители. Получаемая продукция значительно ниже качеством, чем при выращивании кроликов в условиях, приближенных к естественным. Снижаются до минимума как пищевкусовые, так и диетические, и лечебные свойства кроличьего мяса. Шкурки от кроликов, выращенных техническим методом, также низкого качества. Изделия, пошитые из такого меха, носятся не более 3-х лет.

Чтобы выполнить все мероприятия по техническому кролиководству, необходимы огромные капиталовложения, а рентабельность в результате низкая, окупаемость может растянуться на несколько десятилетий. Техническое кролиководство пригодно в первую очередь для большого бизнеса, а для малого и среднего не подходит.

Акселерационное кролиководство. Данный метод появился сравнительно недавно. Первые опыты были проведены академиком Игорем Николаевичем Михайловым в 1970-х гг., а в 1978 г. методу акселерационного кролиководства присвоили статус изобретения.

При данном методе кролики содержатся небольшими группами, не более 10 голов, самки и самцы-производители размещаются индивидуально. Для такого содержания часто изготавливают специальные мини-фермы. Каждая мини-ферма снабжена инженерно-техническими принадлежностями, которые зависят от вида содержащихся в ней кроликов (самец-производитель, кроликоматка, молодняк на откорме, взрослые особи). Благодаря этому, удастся создать условия, максимально приближенные к природным. Мини-ферма состоит из нескольких сооружений, которые можно заменять и создавать условия для комфортного содержания кроликов при любых климатических условиях. Кормление и поение кроликов осуществляют в полуавтоматическом режиме. Моча и кал поступают в особые накопители, естественная вентиляция отсасывает газы, в результате кролик не вдыхает отравленный воздух. При таком содержании зверьки реже болеют. Профилактические мероприятия состоят в соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Случаи падежа практически исключены, происходит существенная экономия за счет профилактики и лечения инфекционных заболеваний. В результате всего этого происходит увеличение прибыли. Данный метод как нельзя лучше подходит для малого и среднего бизнеса.

Выбор кроликов



Решив заняться кролиководством, важно не только досконально ознакомиться с отраслью, но и сделать правильный выбор породы кроликов. В настоящее время их существует большое количество и выбор остается за вами.

В первую очередь будущему владельцу кроликов необходимо решить, с какой целью он намерен заводить пушистых зверьков. Непосредственно от этого будет зависеть выбор породы. После определения предпочтений кроликозаводчику необходимо соорудить для своих еще пока отсутствующих питомцев экономичные, но в то же время удобные в эксплуатации и удовлетворительные с точки зрения гигиены клетки либо оборудовать соответствующие помещения, запастись инвентарем, который понадобится в уходе за кроликами.

Теперь, когда подготовка материально-технической базы завершена, можно приобретать животных. Как правило, для этого сначала обращаются в общество кролиководов за консультацией специалиста, который порекомендует опытных кролиководов. Именно у них обычно и покупают двух-трехмесячных зверьков. Причем делать это лучше всего на дому, а не на рынке, так как большое значение имеет осведомленность об условиях содержания кроликов, особенностях питания – ведь резких перемен в рационе, режиме кормления, содержании быть не должно. Мужских особей приобретают той же породы, что и женских, однако будет благоразумнее это сделать у другого благополучного в разведении животных кроликоведа. При этом ориентируются на самцов, возраст которых на пару месяцев больше, чем у самок, и которые к тому же больше по размеру.

Не следует приобретать экземпляры вялые, плохо упитанные, с признаками недоедания. И пусть продавец убедительно рассказывает об исключительной породистости животных, указывая на недостаточное питание – плохая упитанность служит признаком того, что у кролика не все в порядке со здоровьем. Также в стадо не подходят зверьки, у которых мокрая (или просто влажная) мордочка, корочки в ушах, грязно под хвостом. При этом животных непременно надо не просто осмотреть и ощупать, но и подержать в руках за загривок – со здоровым экземпляром впечатление должно быть такое, как будто в руках упругая пружина,

а больной и слабый вяло свисает, будучи больше похож на кошку, если ее взять таким же образом.

Нужно внимательно осмотреть состояние и строение наружных половых органов. Наличие деформаций, высыпаний на коже и т. п. отклонений от нормы является причиной отбраковывания особи. Если на передних лапках изнутри наблюдаются слипшиеся волосы, то можно с уверенностью сказать, что у кролика заразный насморк. Кроме того, у больной особи глаза мутноватые, неживые, припухшие веки, а шерсть взъерошенная и тусклая.

В обращении с кроликами (начиная с момента приобретения) необходима осторожность, поскольку это животное весьма пугливое, с чувствительной нервной системой. При неожиданном звуке, непривычном шуме, внезапном появлении какого-либо объекта, хотя бы даже и знакомого, кролик пугается, результатом чего может быть, например, аборт, каннибализм (взрослая особь поедает молодняк), травмирование паникующей самки. Последние особенно впечатлительны до и после родов. Таким образом, огромное значение имеет умение сформировать для животных «спокойный микроклимат» — от этого зависит успех их воспроизводства. Любые манипуляции с питомцами надо производить без спешки, спокойно, желательно в отсутствии или при минимальном количестве посторонних.

С самого начала кроликов требуется перемещать из клетки в клетку, из помещения в помещение, брать на руки. Выполнять это произвольным образом нельзя и должен быть некоторый навык. Если осуществлять это неумело, то кролика можно травмировать, нанести ушибы, вызвать кровоподтеки. Хватать животное за уши нельзя, потому что это, во-первых, больно для животного, а во-вторых, можно повредить мышцы диафрагмы, на которых повисает вся тушка зверька. К тому же из-за вытягивания диафрагмы у кроликов затрудняется дыхание, что вполне может послужить причиной летального исхода (остановка дыхания). Также нельзя перемещать животных (особенно взрослых) кверху лапками, поскольку кролики дергаются, в результате чего может нарушиться целостность связок и мускулов. Молодые особи допустимо переносить, схватив за складку кожи на пояснице, чтобы они находились более-менее в горизонтальном положении и не царапались.

Оптимально держать животных за складку кожи на шее и холке, чтобы шея и голова были несколько оттянуты назад, покоясь на кисти руки, т. е. сама рука должна идти параллельно позвоночнику кролика, тогда как вторая рука поддерживает под крестец.

Следует немного подробнее остановиться на выборе породы. Дело это не столь очевидное, каким кажется. Конечно, если речь идет о домашнем питомце, все понятно — выбор зависит от личных пристрастий. Однако с кроликами на разведение ситуация посложнее. Разные породы могут достаточно сильно отличаться друг от друга в плане условий, которые необходимо создавать для их содержания. Получается, что в коммерческом кролиководстве огромную роль играет качество доступного питания и помещения для содержания животных. Именно от кормов и помещения, имеющихся в наличии, зависит выбор той или иной породы. Например, в данной местности у кролиководов Серый великан, а хочется разводить калифорнийскую породу. Прежде чем реализовывать свои намерения, нужно учесть тот факт, что кролиководы не зря предпочитают Серого великана, поскольку причины подобного выбора, как правило, связаны с экономической целесообразностью. Разведение породы, отличающейся от той, которую выбрали все остальные местные кролиководы, наверняка станет проблемой. Кроме того, уникальной для данной местности породе необходимы действительно ощутимые преимущества, для того чтобы выдерживать конкуренцию. Впрочем, подобные соображения не должны ставить крест на прекрасном стремлении разводить новую породу и экспериментировать с ней. В любом месте обязательно найдется энтузиаст, который обладает достаточным опытом, знаниями и навыками для того, чтобы содержать породу, отличающуюся от той, что у других кролиководов, причем нередко она действительно оказывается неконкурентоспособной. Такие люди по-настоящему любят свое занятие и заслуживают по

меньшей мере уважения, ведь они выполняют важную задачу по сохранению редкой породы, чей генетический материал может понадобиться в будущем для ученых или в практических целях. В любом случае, при разведении кроликов редких пород и осуществлении операций по скрещиванию рекомендуется обращаться за советом в научные и исследовательские учреждения.



В естественных условиях кролики живут намного меньше, чем на кролиководческих фермах. В природе они редко живут дольше года, тогда как в хозяйствах эти животные могут дотянуть до 19 лет (такой прецедент кролика-долгожителя имел место).

В кролиководстве значение породы весьма велико, впрочем, как и в животноводстве в целом. Порода способствует ускорению выведения улучшенных особей, выступает символом чистоты, устойчивости наследственных признаков и гарантией перехода к потомкам ценных качеств.

Роль породистости наглядно подтверждается тем обстоятельством, что породистые мясные кролики значительно опережают по живой массе своих беспородных собратьев (примерно в 5 раз). Подобная разница не встречается больше ни у каких других домашних животных. Или, например, можно сравнить качество шкурки – разница поразительна: у советской шиншиллы очень хорошая шкурка и любое целенаправленное скрещивание, не говоря уже о бессистемном, только ухудшит картину. При этом следует помнить, что скорость накопления наследственных признаков из поколения в поколение достаточно маленькая, а вот потерять положительные свойства можно очень быстро, так что к скрещиванию необходимо подходить осторожно, без фанатизма, т. е. не использовать его без нужды. Иными словами, при «грязном» разведении генетический фонд засоряется, генотипы перемешиваются, они получают разного происхождения и устойчивость наследственности теряется. В результате сильно усложняется или становится невозможной целенаправленная планомерная работа по разведению питомцев. Кроме того, с точки зрения хозяйственных признаков помеси довольно редко бывают лучше, чем крольчата у породистых кроликов. Например, обычно изысканная шиншилловая окраска у помесей становится невзрачной, матовой.

Довольно часто начинающие кролиководы совершают ошибку, когда стремятся непременно занять какую-нибудь редкую породу. Естественно, обладание уникальным поголовьем поднимает самооценку, однако практика доказывает, что экономически целесообразнее разводить популярные местные породы. Например, некоторые кролиководы грезят о бельгийской породе фландр, хотя на ее основе уже давно появился отечественный серый великан, причем более ценный.

Хотелось бы чуть подробнее остановиться на использовании кроликов в качестве домашних животных. Обычно в этой роли выступают карликовые декоративные породы. В первую очередь декоративные кролики очень милы, у них крайне симпатичная мордочка, они похожи на маленькие плюшевые игрушки, но живые, с миниатюрными ушками и красивой блестящей шкуркой, шерсть на которой, как правило, обладает яркой и выразительной

расцветкой. Положительных качеств у кроликов много и эти животные выигрывают по сравнению с другими домашними питомцами. Кролики молчаливы, спокойны, любят чистоту, их можно без труда приучить к лотку, оставить на несколько дней в одиночестве, т. е. не надо искать того, кто сможет их выгуливать и кормить. Эти животные в юном возрасте очень привязчивы и повсюду сопровождают хозяина, поэтому необходимо быть осторожными, чтобы случайно не наступить на меховой шарик под ногами. Никакой особой диеты кроликам не требуется, хотя они предпочитают разнообразие в питании. Несмотря на то, что главными продуктами для кроликов являются трава и сено, нужно периодически подкармливать их сочными кормами: морковью, тыквой, зерновыми (овсом, пшеницей) и добавлять в пищу минеральные вещества (мел), а также витамины. Пить кролики могут обычную холодную водопроводную воду.

Являясь грызуном, кролик всегда рад на чем-нибудь опробовать свои сильные зубы, поэтому им требуется подкладывать веточки и сухарики.

При наличии двух или более животных, они играют друг с другом, ласкаются. Правда, это относится к самкам, а самцы предпочитают бороться за территорию. Кролики умеют защищаться. При появлении чужаков они фыркают, барабанят лапками по полу, прижимают уши, принимают грозный вид и, бывает, отчаянно нападают.

Также кроликами временами овладевает навязчивая идея, и они начинают рыть норку. В связи с этим, лучше животных не определять в спальню, иначе они будут мешать спать постоянными скребущими звуками, причем занимаются рытьем в полу они самозабвенно, не обращая внимания на окрики.

Живут карликовые кролики около 9 лет, что довольно долго по сравнению с другими мелкими питомцами, например, хомяком или крысой.

Породы кроликов

Мясо-шкурковые

Советская шиншилла

В полном соответствии с названием, порода была выведена в СССР, для чего скрестили мелкую породу кроликов Советская шиншилла (рис. 1), которую завезли в страну в первой четверти XX в., с породой Белый великан. Впоследствии породу совершенствовали в сторону увеличения живой массы, приспособленности к климату, сохранения качества шкурки.

Крупная порода, в основном серебристо-голубой окраски, за исключением брюшка, нижней стороны хвоста и внутренней стороны конечностей, где преобладает белый цвет. Вокруг глаз наблюдается светлая кайма, а на ушах и сверху хвоста – черная, на затылке клин более светлого оттенка по сравнению с окружающим мехом. Особенностью шиншиллы является неоднородная окраска шерстинок: у основания как остевых так и направляющих цвет голубовато-серый, затем вторые становятся черными, а у первых зоны чередуются, переходя от светлого оттенка к темно-серому и потом к серебристо-белому. Окончания же волос черные, благодаря чему волосяной покров приобретает интересную живость.

Представители данной породы отличаются высокой продуктивностью. Взрослые кролики весят в среднем около 5 кг, а некоторые экземпляры набирают более 7 кг. У животных крепкий скелет и достаточно мощное телосложение. Голова относительно маленькая, с торчащими ушами среднего размера. Тело недлинное, всего около 63–69 см с округлением в районе спины, грудь широкая и глубокая, с подгрудком, ноги сильные, крепкие и прямые.

Новорожденные крольчата весят около 74 г. Растут быстро. От одной самки за один раз рождается в среднем по 8 малышей. От кроликов данной породы получают ценную шкурку значительного размера и с оригинальной расцветкой. Шиншилловая порода является одной из наиболее распространенных у отечественных кролиководов.




Рис. 1. Советская шиншилла

Белый великан

Крупные кролики родом из Бельгии (рис. 2). В России появились в первой четверти XX в. Получили породу в результате долгого скрещивания отдельных представителей белых фландров. В СССР породу усовершенствовали.

В среднем кролики весят около 5 кг, а некоторые экземпляры набирают более 8 кг. Размер удлиненного туловища средний: до 60 см, а обхват груди – до 40 см (однако сама она довольно узкая, прямая, имеется подгрудок). Костяк тонкий, но прочный, голова большая, с широкими ушами длиной примерно 17 см, бедра выдаются в стороны, ноги длинные, прямые, умеренной толщины, глаза красные, шерсть длинная, пушистая, блестящая, упругая, хотя сам волосяной покров пореже и менее однородный, чем у шиншиллы, цвет белый везде. От представителей данной породы получают большую шкурку.

Особенностью Белых великанов является высокая молочность самок, что роднит их с породой Советская шиншилла. В этом есть немалое преимущество, поскольку молодняк быстро набирает вес.

Так как кролики рассматриваемой породы тяжелые и при этом с узким туловищем, то для них не очень подходят закрытые помещения, они более склонны к маститу и продерматиту, окролов приходится отбраковывать. Порой у кроликов имеются и другие недостатки.




Рис. 2. *Белый великан*

По продуктивности разведение Белых великанов несколько ниже, чем Советских шиншилл. К тому же иногда рождаются кролики с пуховым волосяным покровом – их нужно отбраковывать, как и всех их близких родственников. За один окрол от одной самки, отличающейся хорошо развитыми материнскими качествами, получают 7–8 малышей.

Данная порода также является одной из самых популярных в личных хозяйствах.

Серый великан

Порода отличается высокой продуктивностью (рис. 3). Животные большие, разнообразной окраски: различных оттенков серого, белые, черные.

Родиной породы можно считать Украину, где Серого великана вывели путем скрещивания фландра с местными беспородными экземплярами. В последующем породу совершенствовали для сохранения наиболее полезных хозяйственных признаков.




Рис. 3. *Серый великан*

Поскольку в предках Серого великана находится фландр, то это обеспечило крупные размеры и немалый вес, тогда как от беспородных предков достались выносливость, жизнестойкость, приспособленность к местному климату, значительная плодовитость.

Телосложение у зверьков этой породы мощное, а порой даже грубоватое, с массивным костяком. Голова большая, огрубленная, уши длинные, толстые, тело вытянутое, длиной около 65 см с широкой и глубокой грудью и часто с внушительным подгрудком.

Спина длинная и широкая, прямая, ноги массивные, прямые. Масса зрелых особей в среднем составляет 5 кг, а некоторые экземпляры весят около 7 кг. Если сравнивать Серых великанов с кроликами смешанной мясо-шкурковой направленности, они выгодно смотрятся, однако проигрывают специализированным мясным породам.

На свет крольчата (в среднем по 7–8) появляются, как правило, с массой около 80 г и быстро наращивают ее в последующие несколько месяцев. От кроликов получают крупные шкурки, волосяной покров которых все-таки реже, чем у Советской шиншиллы и некоторых других распространенных пород. Серые великаны более приспособлены к теплым условиям проживания, поэтому популярны в южных районах.

Серебристый

Кролики отличаются довольно большими размерами и серебристым цветом волосяного покрова. На разных частях тела оттенок практически не отличается, за исключением кончика мордочки и ушей, верхней стороны хвоста и конечностей, которые несколько более темные.

Происхождение породы связано со зверосовхозами Тульской, Петровской и Полтавской областей, где ее вывели в середине XX в., взяв за основу породу Шампань, завезенную в Россию в 1920-х гг. Путем целенаправленной селекции сформировали большое поголовье

животных, в выгодную сторону отличающихся от породы Шампань по мясной продуктивности и качеству шерсти.




Рис. 4. *Серебристый*

У серебристых кроликов (рис. 4) пропорциональное телосложение и крепкий скелет. Голова небольшая, с вертикально расположенными недлинными ушами, коротковатым (около 57 см) плотным туловищем, широкой грудью (нередко присутствует подгрудок), спина прямая, с хорошо развитой мускулатурой, лапы сильные, пропорциональные. Живая масса взрослых кроликов в среднем составляет около 4,5 кг, иногда до 6,5 кг. Молодняк при рождении весит около 75 г. Отличаются высокой скоростью роста. Данная порода характеризуется хорошими мясными качествами (мясо вкусное и сочное), а внешний вид тушек весьма привлекательный. За один раз у самки рождаются, как правило, 8 детенышей.

Шкурки от Серебристых кроликов большие, с интересной окраской и хорошей опушенностью.

Популярность Серебристых кроликов не такая значительная, как у вышеописанных пород, несмотря на то, что этих кроликов можно разводить в разных регионах страны. Они замечательно акклиматизируются, практически так же хорошо, как шиншилла или Венский голубой. Если Серебристого качественно кормить, он хорошо чувствует себя в холодных условиях. Разводить животных лучше в клетках, а не в закрытых помещениях. В последнем случае будет наблюдаться снижение воспроизводительной способности.

Золотистый

Данная порода кроликов стала распространяться в СССР в 1970-е гг., а причиной их появления стала мутация у самок Серого великана (хозяйство располагалось в Крыму).

У кроликов этой породы оригинальный и красивый окрас волосяного покрова. Пух светло-желтый, брюхо, ноги, хвост белые, а остальное туловище золотистое. Конституция правильная, телосложение крепкое, спина прямая, лапы широко расставлены, голова среднего размера, удлинённая, с торчащими небольшими ушами и глазами коричневого цвета.

Взрослые особи весят в среднем 4,5 кг (в возрасте 3-х месяцев – около 2,4 кг). Самки приносят до 10 крольчат за один раз и отличаются хорошим материнским инстинктом. У детенышей окрас шерсти нередко более контрастный по сравнению со зрелыми особями.

По характеру представители Золотистой породы энергичные, подвижные. Разводят кроликов этой породы как из-за их необычной шкурки, так и из-за вкусного мяса. Мясная продуктивность почти такая же, как и у Серого великана.

Венский голубой

Свою родословную порода (рис. 5) ведет из Австрии. Выведена в конце XIX в. путем элементарного скрещивания фландра с местными Венскими кроликами с шерстью голубого цвета. Сизо-голубых оставляли на племя.

Представители этой породы отличаются средними размерами, окрас шерсти сизо-голубой, тональность варьируется от светлого до темного. Окраска обычно равномерная, у основания волос несколько светлее. Пух темнее волос. Первоначально живая масса кроликов составляла около 3,6–3,9 кг, продуктивность (для того времени) была высокой. Самки приносили примерно 7 крольчат.

В СССР породу улучшали, и небезрезультатно – сейчас живая масса кроликов представленной породы в среднем составляет 4,5 кг, а масса некоторых экземпляров превышает 7 кг.



Жизнь кролика полна опасностей. Например, хищники одним своим видом могут напугать кролика вплоть до шока и остановки сердца. К тому же у ушастых зверьков довольно слабый иммунитет и они подвержены инфекционным заболеваниям.

Животные крепкие, с правильным телосложением, легкой короткой головой, торчащими небольшими ушами, компактным, хотя и относительно крупным туловищем (57 см длиной), широкой грудью (иногда с подгрудком у самок), спина удлиненная и широкая, лапы сильные, прямые, умеренной толщины. При появлении на свет малыши весят около 70 г. Растут быстро, набирая 3 кг через 4 месяца. Кролики этой породы характеризуются средней производительностью.

От каждой самки рождается в среднем 8 крольчат, которые благодаря прекрасному материнскому инстинкту хорошо сохраняются. В основном от этой породы получают замечательные шкурки с мягким и пушистым мехом – в этом преимущество Венских голубых перед многими другими породами мясо-шкурного направления. Шкурки Венских кроликов высоко ценятся.

Животные легко приспосабливаются к новым климатическим условиям, выносливы, поэтому их разводят в совершенно разных регионах. Поскольку кролики хорошо переносят холод, то можно добиваться появления крольчат зимой, причем они успешно сохраняются, несмотря на низкие температуры. В связи с этим, животные данной породы не требо-

вательны к условиям содержания – будь то клетки на улице либо крольчатники, оснащенные климатическим оборудованием.




Рис. 5. *Венский голубой*

Русский горностаевый

Кролики этой породы (рис. 6) отличаются небольшим размером, широким ареалом проживания – в разных частях планеты порода называется по-разному: гималайская, египетская, русская, антверпенская, китайская и др. мех у животных белый, блестящий, а черный или темно-коричневый цвет имеется на ушах, кончике носа, лапках и хвосте. По расцветке мех напоминает горностаевый, в связи с чем порода и получила такое название.

Точно неизвестно, откуда ведут свою родословную эти кролики. Достаточно убедительно выглядит теория о том, что кроликов данной породы получили от горностаевых кроликов шкурковой направленности, которых в первой четверти XX в. завезли из Англии.

Телосложение этих зверьков правильное, костяк крепкий. Туловище довольно короткое (около 50 см), широкое, максимальный вес зрелых кроликов раньше составлял всего 2,5 кг, в настоящее время – в среднем около 4 кг, а наибольший в районе 5 кг.

Голова достаточно маленькая, округлая, уши вертикально торчат, грудь широкая, спина прямая, лапы прямые, сильные.

Кролики этой породы выносливые, обладают устойчивым иммунитетом к заболеваниям, хорошо приспосабливаются к новым климатическим

условиям. Самки приносят по 8 детенышей и проявляют хороший материнский инстинкт.

Сначала у молодняка окраска полностью белая, а черные и коричневые пятна образуются спустя несколько недель после рождения. В 6-месячном возрасте мех кроликов приобретает окончательную палитру. Как правило, горностаевых кроликов разводят для получения диетического мяса и небольших шкурок. Причем мех на шкурках очень красивый, приятный на ощупь, густой.

Надо сказать, что в России кролики данной породы не слишком распространены. Существует мнение, что разведение с направленностью на увеличение живой массы отрицательно сказалось на другом полезном качестве – густоте меха.




Рис. 6. *Русский горностаевый*

Советский мардер

Поскольку в переводе с немецкого слово «мардер» означает «куница», то можно догадаться, что кролики этой породы по окраске меха похожи на одноименное лесное млекопитающее (в основном светло-коричневый окрас, но мордочка, хвост и лапы более темные). Кроме того, из названия ясно, что порода выведена в СССР. Случилось это непосредственно в годы перед Великой Отечественной войной на территории Армянской ССР.




Рис. 7. *Советский мардер*

У Советских мардеров (рис. 7) крепкое гармоничное телосложение, голова среднего размера, округлая, уши небольшие, туловище коренастое, плотно сбитое, грудь широкая – подгрудок не наблюдается, спина короткая, несколько закругленная, лапы крепкие, прямые.

Живая масса взрослых особей составляет около 3,8 кг, максимум – в районе 6,5 кг. Молодняк при появлении на свет весит примерно 60 г.

Самки дают многочисленное потомство: за один раз в среднем 11 малышей. Кролики этой породы ценятся за густой мягкий мех эффектной расцветки. Пух в шкурках также очень густой, поэтому шкурки в естественном виде используют для изготовления меховых изделий. Впрочем, из-за того, что окраска меха неравномерная, с местами то более светлого, то более темного оттенка, ценность шкурки снижается.

Лучше всего мардеры акклиматизированы в южных регионах. В Армении порода получила большое распространение.

Бабочка

Родиной породы является Англия, где в конце XIX в. вывели кроликов с оригинальной шкуркой. Порода вскоре стала популярна у многих кролиководов по всему миру, а в разных странах на базе Бабочки создавали свои породы (рис. 8).

По размеру кролики средние, с интересной окраской меха: основной фон белый, а по нему на спине и боках разбросаны пятна различной формы, на мордочке в стороны от носа на щеки отходят по 2 пятна, производя впечатление крыльев бабочки, из-за чего порода и получила свое название.




Рис. 8. *Бабочка*

Когда кролики очутились в России, они не могли похвастаться внушительными размерами, достигая веса всего 3 кг. Породу пришлось совершенствовать, приспособлявая к отечественным климатическим и кормовым условиям, для чего осуществлялось скрещивание с фландром, Венским голубым и др. В каждом поколении оставляли особей, наиболее отвечающих необходимым требованиям.

Сейчас живая масса кроликов составляет в основном около 4,2 кг. Зверьки обладают хорошим телосложением, крепким костяком, максимальная длина туловища около 55 см, грудь широкая, частенько с подгрудком, спина достаточно длинная, широкая, лапы прямые, сильные. У самцов голова довольно большая, округлая, а у самок она несколько вытянутая, среднего размера.

Самки приносят за один раз 8 детенышей, отличаются прекрасным материнским инстинктом, высокой молочностью.

Шкурки от представителей этой породы могут быть маленькие или большие, с мягким блестящим ровным мехом умеренной густоты. Пегий узор на шкуре весьма эффектный.

В России кролики данной породы не распространены. Обычно их разводят кролиководы-энтузиасты.

Фландр

Фландр является одной из наиболее распространенных промышленных пород в мире. Иногда ее еще называют Бельгийский великан. В СССР (а сейчас в России) чаще всего встречалась разновидность породы под названием Белый великан. Но вообще у фландра окраска меха может быть разной: черной, голубой, серой, белой и т. д.

Родиной породы считается Бельгия, где ее якобы вывели в одноименной провинции в XIX в. Но достоверных сведений о настоящем происхождении этих кроликов нет. Существует мнение, что они были завезены из Аргентины в XVI столетии.

Животное характеризуется длинным туловищем (около 70 см), мощным костяком, крупной головой, прямостоячими большими ушами, отлично развитой широкой грудью, прямой спиной (порой с некоторым прогибом), окраска разных частей тела различается. Весят кролики в среднем около 5,5 кг, максимум – до 9 кг. От одной самки за один раз рождается 7 крольчат, живая масса которых составляет около 65 г.

В основном эту породу используют как основу для выведения новых, более продуктивных пород. Однако и сам по себе фландр очень мясистый, за что ценится многими кролиководами. Кроликов этой породы можно содержать в домашних условиях, такой домашний питомец достаточно распространен на Западе. Только надо учесть, что фландр, в отличие от декоративных кроликов, большое животное и ему понадобится больше пространства и пищи.

Ризен

Если название перевести с немецкого языка, то получится «немецкий гигант». Порода достаточно известная и является производной от фландров. Иногда можно встретить мнение, что ризен и фландр – названия одной породы, однако это не так. Фландры распространились в Германии в конце XIX столетия. Тогда они были меньше, чем сейчас, и кролиководы, естественно, стремились улучшить породу, вероятно, скрещивая фландров с местными породами, пока не выделилась отдельная группа кроликов с устойчивыми признаками, получившая название Дойч ризен.

Живая масса зверьков составляет в среднем 7 кг, хотя некоторые редкие экземпляры ставят рекорды, достигая 10–14 кг. Туловище длинное (70 см), вытянутое, широкое, мясистое, крепкий костяк, лапы длинные, сильные, голова крупная, щеки полные, уши бывают довольно длинные (до 20 см), но широкие, прямостоячие, мех густой, слабо приминается, волосы длиной около 40 мм, глаза коричневого цвета.



Не стоит оставлять мужские особи кроликов наедине с молодняком: самцы плохие няньки, поскольку норовят убить крольчат или съесть их. Конечно, подобное поведение может наблюдаться и у самок, однако оно является редкостью и свидетельствует о серьезных гормональных нарушениях.

На данный момент ризены – одна из наиболее популярных пород в Германии, которую разводят для того, чтобы получить вкусное мясо и замечательную шкурку. Впрочем, есть некоторые подводные камни, а именно позднее половое созревание не позволяет назвать породу рентабельной, так же, как специфические проблемы со здоровьем, потребность в большом количестве корма и обширном пространстве. Надо сказать, что к разведению в конкретной местности лучше всего подходит своя разновидность фландра, т. е. ризен оптимален для Германии, а для России – Серый великан.

Что касается содержания ризенов в домашних условиях, то такие случаи редки. Благодаря их спокойному характеру и высокому интеллекту, с этими животными приятно иметь дело, однако в семье с маленькими детьми не рекомендуется брать ризенов. Очень маленьким детям ризены, по причине своей массивности, могут невзначай причинить вред. мех у кроликов достаточно короткий и ухаживать за ним нетрудно, а вот о пространстве для животного подумать придется.

Новозеландская красная

Родиной породы являются США, где ее вывели в начале XX в. как чисто мясную путем скрещивания Бельгийского зайца, Серебристой породы и фландра (рис. 9). Отличается коротким густым и жестким мехом рыжевато-красного цвета. Туловище мясистое, недлинное, всего около 50 см. Голова маленькая, на короткой шее, уши короткие, спина и грудь широкие, подгрудок не наблюдается, ноги толстые, короткие.




Рис. 9. Новозеландская красная

Взрослые зверьки весят около 4,6–4,9 кг, причем мужские особи крупнее женских. Из последних получают заботливые мамы с высокой молочностью, за один окрол приносящие около 10 малышей. Молодняк развивается быстро. Обычно его оставляют на пару месяцев под самкой, после чего забивают на мясо.

Черно-огненный

Кролики этой породы впервые появились в Англии в конце XIX в. Выводилась она для получения шкурок, хотя мясо у кроликов весьма вкусное.

Размеры кроликов средние, весят они тоже не очень много (не более 3,5 кг), расцветка меха соответствует названию, т. е. черно-огненная. По бокам кролика, там, где сходятся черный и желтый оттенки, порой имеется яркая полоска, над которой растут светло-желтые волосы.

Кролики данной породы имеют крепкое, хотя временами немного изнеженное телосложение, легкую, сравнительно маленькую голову, туловище короткое, плотное, грудь не всегда широкую, спину прямую, лапы прямые, крепкие.

Кроликов этой породы выращивают из-за вкусного мяса и интересных шкурок. Мех густой, мягкий, приятный на ощупь, блестящий. Без обработки шкурки используют при пошиве меховых изделий, очень востребованных среди населения.

Черно-бурый

Эту породу (рис. 10) вывели в середине XX в. в СССР путем скрещивания Белого великана, фландра и Венского голубого. Результат превзошел ожидания: получили племя высокопродуктивных кроликов, которых выделили в отдельную породу.

Название пошло от окраски меха. Причина подобной расцветки заключается в том, что мех окрашен неоднородно. Если направляющие волосы черные (снизу светлее, чем сверху), то остевые по бокам кролика в основании голубовато-серые, затем повыше они бурые и желтовато-белые, а в самом верху черные. Пух светло-голубой. Поскольку кончики волос черные, то по всему телу животного образуется своего рода черное покрывало, которое создает интересный визуальный эффект. В итоге получается, что голова и спина животных черные, а бока черно-бурые.

Весят животные в среднем около 5 кг, максимум в районе 6,5 кг (иногда до 7 кг), отличаются умеренной скороспелостью, хорошей мясистойостью.




Рис. 10. Черно-бурый

Телосложение правильное, крепкое, несколько грубоватое, мощный костяк, голова большая, уши широкие средней длины (около 18 см). Туловище сильное, массивное, вытянутое (длина около 60 см), грудь широкая, нередко с развитым подгрудком, спина длинная, прямая, широкая, лапы прямые, длинные, толстые.

Молодняк при появлении на свет весит около 80 г. Если не экономить на питании, то к 3-х месячному возрасту они набирают около 2,5 кг.

Самки приносят за один окрол в среднем 8 малышей, после чего обильно поят их молоком и проявляют исключительную заботу.

Как правило, в коммерческом отношении кролики полезны благодаря своим шкуркам с оригинально окрашенным мехом. У кроликов данной породы плотность пуха наивысшая по сравнению с другими породами. В обработке шкурки нет необходимости – для изготовления меховых изделий их используют в натуральном виде.

Кролики этой породы отлично чувствуют себя в Средней полосе России.

Тюрингенский

Для России это редкий вид кроликов шкуркового направления, хотя в Европе весьма распространен, где его разводят кролиководы и держат в качестве домашнего животного.

Родиной зверюшек является Германия, а точнее, одноименные земли. Считается, что порода выведена в конце XIX – начале XX в. путем скрещивания представителей фландров, арджентов, русских горностаевых пород.

Широкому разведению породы препятствует то, что ее отличительные признаки довольно зыбки и с трудом сохраняются. В России существуют другие похожие породы, которые более приспособлены к местным условиям, – наверное, в этом причина нераспространенности тюрингена.

У кроликов тюрингенской породы средний размер, живая масса в среднем около 4 кг. Туловище довольно короткое, сбитое, округлое. Голова широкая, несколько сплюснутая по вертикали, шея короткая, глаза темно-коричневые, уши прямостоячие, длиной чуть более 10 см, закругленные, лапы сильные, умеренной длины, на желто-песочном мехе разбросаны темные пятна.

Окраска у молодняка при рождении однообразная, а темные пятна появляются с возрастом. Мех густой, красивый, гладкий. Надо сказать, что от сезона к сезону в течение года оттенок меха несколько изменяется, становясь то темнее, то светлее.

У кролиководов очень ценится шкурка тюрингена с изысканным плотным меховым покровом, а также вкусное мясо.

В Европе кроликов этой породы частенько содержат в качестве домашних питомцев. По характеру животное милое, активное, доброе, к тому же с красивой и оригинальной внешностью. Какого-то особенного ухода кролик не требует.

Рекс

Кроликов данной породы (рис. 11) получили во Франции в первой четверти XX в. В Россию животные попали из Германии. Поскольку шкурка с великолепным волосным покровом ценится высоко, то разводить их экономически целесообразно.




Рис. 11. *Рекс*

Мех у этих кроликов весьма специфический. Было время, когда его приводили в пример всем остальным как эталонный – бытовало мнение, что у рексов отсутствуют остевые волосы, в результате чего мех походит на велюр. Впрочем, это заблуждение было впоследствии развеяно. Оказалось, что у кроликов этой породы короткие и тонкие волосы (длина остевых и направляющих около 18–20 мм, а пуха, приблизительно 17–18 мм), намного тоньше, чем у других шерстных пород, хотя соотношение количества волос разного вида то же, что и у других кроликов мясо-шкуркового направления. Поскольку остевые волосы и пух частенько одинаковой длины, то мех выглядит очень ровным, производя впечатление подстриженного.

Цветовая раскраска бывает разной: бобровая с темно-коричневой спиной, светлыми боками и белым животом, шиншиллового, черная, белая и т. д. (около 20 вариантов).

Голова маленькая, несколько удлиненная, уши умеренной длины и толщины, грудь узкая, имеется подгрудок, спина узкая, вытянутая, порой с незначительным горбом, конечности тонкие и прямые.

Самки не слишком плодовиты – приносят около 6 малышей за окрол (4–5 раз в год). Взрослые особи длиной около 50 см, весят в среднем 4 кг.

Рексы склонны к заболеванию пододерматитом (язвы на лапах), поэтому их не содержат в клетках с сетчатым полом, а подкладывают толстую соломенную подстилку (можно из сена, но это нехорошо в плане гигиены), либо помещают в клетки с реечным или фанерным полом. В последнем случае фанера должна быть достаточно толстая, не менее 1 см.

Шампань

Одна из древнейших пород кроликов мясо-шкурковой направленности (возраст насчитывает свыше четырех столетий). Кролики этой породы всегда ценились за великолепную шкурку с мехом серебристой окраски, напоминающим старинное серебро, а также за вкусное мясо. Родиной считается Индия, однако название порода получила от одноименной французской провинции, где ее сохранили и усовершенствовали. В Северной Америке кро-

лики оказались в 1920-х гг., а в СССР на основе французской породы вывели собственную под названием «серебристая» – она лучше приспособлена к отечественным условиям.

Туловище у кроликов средней длины, к голове сужается, крепкий костяк, спина округлая, грудь широкая, порой с маленьким подгрудком, голова среднего размера, уши прямостоячие недлинные, округлые. Шерсть мягкая, блестящая, серебристого окраса. На кончике морды частенько бывает пятно черного цвета в стороны от носа, а также черные уши, вокруг глаз, кое-где на лапах и хвосте. Серебристый оттенок обусловлен тем, что у кроликов остевые волосы белые и черные, а пух голубой. Разное соотношение тех или иных волос приводит к тому, что кролики могут быть темными или светлыми. В зависимости от пропорционального содержания различных волосков, в итоге животные получаются темные или светлые (лучше всего, если умеренно серые). Конечности недлинные, ровные, сильные. Цвет глаз карий. Любопытно, что молодняк появляется на свет практически полностью черный, но через несколько недель запускается процесс осветления, который завершается примерно к 6-му месяцу жизни.

Разводить эту породу весьма выгодно, она хорошо откармливается и быстро набирает вес, давая кролиководу вкусное мясо и ценную шкурку. Впрочем, доступны и более рентабельные породы, поэтому популярность шампани в коммерческих целях не слишком высока. Однако энтузиасты активно внедряют в массы любимую породу. По продуктивности кролики этой породы схожи с представителями Советских шиншилл и Серых великанов. Как правило, шампанских держат, пока они не достигнут возраста 3,5 года. Также необходимо сказать, что они плохо переносят жару. В одном приплоде рождается 5–6 крольчат.



При высокой температуре окружающей среды репродуктивная способность кроликов резко падает, вплоть до полной стерильности, а при снижении температуры способность восстанавливается. Любопытно, что у женских особей раздвоенные матки, т. е. они могут одновременно вынашивать 2 помета от разных отцов.

Внешний вид шампанских кроликов очень эффектный и вполне можно было бы завести их в качестве домашних животных. Некоторые так и делают, утверждая, что лучше породы для домашнего содержания кроликов не найти. Они очень мягкие по характеру, послушные, подвижные (необходимо достаточно свободного места) и неагрессивные. Никакого особенного ухода за шерстью кроликов не требуется. Несмотря на это, порода в основном рассматривается как промышленная.

Беверен

Родословная породы уходит корнями в Бельгию конца XIX в., в одноименный город. Эти животные отличаются большим размером: женские особи достигают 4, 5 кг, а мужские – 4 кг. Отличительной характеристикой кроликов являются красивые уши, небольшие, прямостоячие. Между ушами формируется буква V.

Окраска меха бывает белой, голубой или черной. Изначальным был именно голубой цвет, причем мех в глубине мог быть лавандовым. Неприемлемо, если имеются темно-голубые участки и серебристый отлив. Цвет глаз голубовато-серый. Белый кролик должен быть чисто белым, без оттенков. Цвет глаз ярко-голубой. Черный волосяной покров остается черным и в глубине, только подшерсток темно-голубой. Цвет глаз темно-коричневый. Надо сказать, что беверены являются достаточно редкими. Женские особи рожают много крольчат и хорошо о них заботятся впоследствии.

Аляска

Эти кролики мясо-шкуркового направления обладают средними размерами, черным глянцевым мехом с темным подшерстком (рис. 12). Родиной породы является Германия, где ее вывели в первой четверти XX столетия.




Рис. 12. *Аляска*

У представителей этой породы правильное телосложение, туловище вытянутое, длиной 43–45 см, приземистое, формы округлые, шеи практически нет, голова овальная, несколько удлинённая, глаза карие, спина короткая, чуть выгнута вверх, грудь широкая, конечности умеренной длины, мощные, уши средней длины, прямостоячие, черно-бурого цвета, волосяной покров густой, длинный, сверху волос черный и глянцевый, а снизу голубой, на животе черный, порой матовый, весят кролики 3,3–3,9 кг.

Самки хорошие матери, с высокой молочностью, за один окрол приносят в среднем 6 малышей. Кролики непривередливы к условиям содержания.

Помимо мяса, от кроликов получают шкурки разного размера с однотонным волосяным покровом.

Иногда можно увидеть кроликов с матовым и рыжеватым мехом. Или же бывают островки белых волос, но это нежелательный признак. В основном разведением Аляски занимаются кролиководы-любители.

Мясные

Новозеландская белая

Белые кролики среднего размера (рис. 13). Родиной являются США, где в начале XX в. породу вывели, взяв за основу белые экземпляры породы Новозеландская красная. Потом выделенную породу белых улучшали, отбирая по скорости роста, живой массе, убойному выходу и качеству мяса. Кроме того, рассматриваемая порода была скрещена с кроликами породы Фландр, чтобы увеличить живую массу.

В 1970-х гг. Новозеландские белые появились в СССР. Акклиматизация в новых условиях для кроликов прошла отлично.




Рис. 13. *Новозеландская белая*

Взрослые кролики весят около 4,5 кг (максимум 5 кг), характеризуются правильным и крепким телосложением, мощным костяком, относительно маленькой головой, уши недлинные, тонкие, торчащие, туловище средней длины (у самцов около 47 см, а у самок примерно 50 см), пропорциональное, мускулистое, грудь широкая, спина прямая, широкая, мясистая, лапы прямые, сильные, обросшие, опушенные (что особенно важно при содержании на решетчатом полу).

Представители Новозеландской белой быстро растут, особенно молодняк, который появляется на свет с массой всего 45 г, но за 3 месяца набирает 3 кг. Породы весьма плодовитая: самки отличаются высокой молочностью и хорошим материнским инстинктом. За один окрол приносят в среднем 10 малышей, в связи с чем кроликов этой породы выращивают как бройлеров. В основном разводят на мясо, а шкурка является своего рода дополнительным бонусом. Она может быть разного размера, белого окраса без примесей, с густым и плотным мехом.

У кроликов рассматриваемой породы спокойный характер, немного большая стрессоустойчивость по сравнению с другими породами. Поскольку снизу все лапы имеют волосяной покров, то кролики хорошо чувствуют себя и в клетках с сетчатым полом.

По поводу разведения Новозеландской белой есть некоторые замечания. Если породу смешать с Бельгийским великаном (Новозеландская должна быть материнской), то интенсивность роста будет еще больше. Из-за повышенной скороспелости Новозеландские кро-

лики склонны к ожирению в юности. Впервые спаривать их нужно до того, как им исполнится 6 месяцев.

Калифорнийская

Как следует из названия, родиной породы является Калифорния. По размеру кролики средние, окрас по преимуществу белый, хотя уши, кончики носа, лап, хвоста темно-коричневые (рис. 14). Иногда встречаются кролики голубого, сиреневого, шоколадного цвета. Порода выведена путем скрещивания Новозеландской белой, Русской горностаевой, шиншиллы большого размера. В дальнейшем отбирали экземпляры, отвечающие необходимым требованиям. В Россию порода была завезена в начале 1970-х гг.




Рис. 14. *Калифорнийская*

Телосложение кроликов правильное, костяк крепкий, несмотря на легкость и тонкость. Голова легкая, прямостоячие уши длиной всего около 11 см, шея короткая, подгрудок не наблюдается, туловище компактное, сбитое, гармоничное, с развитой мускулатурой, грудь широкая, спина с бугорком, короткая, широкая, конечности короткие, толстые, глаза розовые. мех густой, волосы восстанавливают положение после поглаживания.

Живая масса зрелых кроликов в среднем составляет 5 кг. Новорожденные весят в районе 45 г, а в возрасте 4-х месяцев их вес превышает 4 кг. Затем скорость роста заметно снижается.

Калифорнийская порода считается второй по популярности мясной породой в мире. Это и понятно, ведь калифорнийцы замечательно приспосабливаются к разным условиям окружающей среды. От этих кроликов получают не только отличное мясо, но и прекрасную шкурку.

Самки, являясь хорошими матерями с высокой молочностью, приносят чаще всего 8 малышей за один раз. Если использовать уплотненные окролы, то за год вполне реально получать до 35 крольчат.

Поскольку калифорнийцы красивые, средние по размеру, умные, добрые, то могут быть хорошими домашними питомцами. Впрочем, если в доме маленькие дети, то лучше выбирать кроликов поменьше – с калифорнийским детям все же будет сложно справиться.

Бургундская

Выведена во Франции на основе Новозеландской красной и Калифорнийской в начале XX в.

в одноименной провинции, а с 1960-х гг. распространилась по европейским странам. В России появилась в начале 1990-х гг. В скандинавских странах, Италии эта порода считается одной из лучших среди мясных.

Кролики обладают крепким и гармоничным телосложением, надежным костяком, в то же время легким, компактным, несколько удлиненным стройным туловищем, относительно маленькой головой с вертикально стоящими ушами умеренной длины (около 12 см), короткой шеей, широкой грудью, прямой, короткой и широкой спиной, отлично развитой мускулатурой. Волосыное покрытие желто-красное (светло-ржавое).

Живая масса зрелого кролика составляет в среднем 5 кг. Женские особи обладают хорошими материнскими качествами, высокой молочностью и приносят в помете до 12 крольчат за один раз. Молодняк не склонен к болезням желудочно-кишечного тракта.

Декоративные

Бельгийский заяц

Удивительная порода домашнего кролика (рис. 15), полученная путем направленной селекции поголовья дикого кролика. Они даже внешне похожи.

Бельгийцы находятся на первых местах в мировом рейтинге наиболее умных и подвижных кроликов. Утром и ночью они предпочитают бодрствовать, а днем спать.

Выведение породы происходило в XVIII столетии в Бельгии. Сначала предполагалось, что новая порода будет мясной. Когда во второй половине XIX в. кролик попал на острова Туманного Альбиона, то там он получил свое имя. Английские кролиководы улучшили породу, сделав ее более энергичной. Вскоре заяц попал в США, где даже создали «Американский клуб бельгийского зайца», существующий и поныне. В первой четверти XX в. популярность породы пошла на спад, поскольку не удалось привлечь бельгийца к гонкам, а также не удалось разводить на мясо. В настоящее время порода считается довольно редкой, что в немалой степени связано с трудностями разведения.

У кроликов этой породы туловище по строению напоминает заячье, т. е. длинное, худое, мышечное, стройное, спина выгнута вверх, конечности длинные, прямые и ловкие, а задние лапы четко очерчены, ровные и тонкие, голова вытянутая, глаза узкие, карие, уши средней величины направлены вверх или назад, прямой хвост параллелен туловищу. мех короткий, густой, жесткий. Окрас меха уникальный для домашних кроликов: сочный каштановый (светло-желтый, насыщенный оранжевый) с черными волнами или пятнами. Живая масса в среднем составляет 5 кг.




Рис. 15. Бельгийский заяц

Бельгийский кролик отличается от других домашних кроликов – ему требуются несколько иные жилищные условия, больше внимания и заботы. Поскольку этот кролик очень энергичный и к тому же довольно крупный, то лучше подготовить большую клетку (60 × 125 см, а для размножения – 80 × 155 см) или вольер, вентиляция обязательна. Пол должен быть твердый. Его застилают соломой или чем-то похожим (но не хвойной стружкой, из-за которой возникает заболевание дыхательных путей, не опилками, которые могут раздражать глаза). Кролик должен иметь возможность вытягиваться и доставать до емкости с водой.



Кроликов было бы правильно называть «социальными» животными, так как в естественных условиях они предпочитают держаться группами. Любопытно, что когда-то этих животных заселяли группами на какой-нибудь необитаемый остров, чтобы они там размножались. Делалось это из практических соображений: у жертв кораблекрушения, доплывших до острова, было пропитание.

Клетки надо чистить каждую неделю, используя моющие средства, предназначенные для кроличьих клеток. Поскольку у бельгийца волосяной покров недлинный, то особого ухода не требует, за исключением вычесывания мертвой шерсти.

Представители этой породы очень активны и сообразительны настолько, что их можно научить откликаться на имя и проделывать какие-нибудь несложные трюки, приучить их к лотку совсем нетрудно. Восприятие у кроликов чуткое, даже чрезмерно – они пугливы и

могут неадекватно отреагировать даже на незначительный внезапный звук или движение, в связи с чем некоторые ставят около клеток постоянно работающее радио, чтобы животные привыкали к шуму.

Оптимальный возраст для спаривания – примерно 9 месяцев. Самки могут за один раз приносить до 12 крольчат. Впервые рожать им следует до того, как они достигнут возраста 1 года. Дело в том, что в этом возрасте тазовые кости срастаются и роды не могут происходить без посторонней помощи. По этой же причине нельзя рожать по достижении 3-летнего возраста.

Поскольку мужские особи разные по характеру, темпераменту, то при размножении приходится учитывать их индивидуальные привычки.

Немецкий пестрый великан

Относится к породе мясной продуктивности. Ведет свою родословную от Бельгийского фландра и насчитывает около 400 лет. Имеет характерную пятнистость, на которую обратили внимание в разведении лишь в XIX в. и которую называли «бабочка». Породой серьезно занимались во Франции и Англии.

Большую работу по совершенствованию породы провели в Бельгии, а в конце XIX в. кролик оказался в Германии. Немецкие кролиководы длительное время не могли добиться желаемого рисунка, это им удалось только в начале XX в.

Живая масса кроликов в среднем составляет 6 кг, а максимальная – 10 кг. Чтобы часть рисунка не пропадала, пятнистого кролика спаривают с однотонным. Телосложение пропорциональное, крепкое, скелет этого великана относительно легкий, мышцы твердые, отлично развитая грудь и мускулатура, у самок возможен подгрудок, крупная и широкая голова, мощные мясистые уши. Длина туловища около 67 см. В идеале, каждый месяц жизни кролик должен прибавлять по 1 кг к живой массе (до определенного момента, конечно).

Волосистой покров недлинный, плотный, блестящий. Рисунок следующий: на голове от носа в разные стороны отходят пятна, напоминающие бабочку, а ее «туловище» находится как раз на спинке носа кролика, вокруг глаз не соприкасающиеся ободки, круги под глазами, уши окрашены полностью, на спине продольная полоса шириной около 30 мм (идет от ушей до хвоста и на хвосте), по бокам небольшие круговые пятна, на лапах тоже есть пятна, но они обычно не принимаются во внимание. Как правило, цвет фона белый, а пятна черные и голубые.

Самки, являющиеся отличными матерями с высокой молочностью, за окрол приносят до 8 малышей.

К отечественным условиям порода приспособлена хорошо.

Голландская

Данная порода является одной из самых старых в мире. Истоки родословной связаны, как видно из названия, с Голландией, а точнее, с голландско-бельгийскими землями. Предполагается, что непосредственными предками кроликов этой породы являются представители мелкой брабантской породы родом из Фландрии. Во второй половине XIX в. голландец очутился в Англии, после чего со временем стал популярным во всем мире.

Кроликов (рис. 16) характеризуют пестрая окраска, грубоватая передняя часть головы, сама она пропорциональная, с округлыми щеками, уши широкие, довольно длинные (18 см), крепко сбитое округлое туловище, несколько вытянутое, длиной около 60 см, грудь широкая, длинная и широкая спина, закругленная в районе крупа, лапы прямые, длинные и толстые.

Живая масса в среднем составляет 5 кг (максимум до 6,5–7 кг). При появлении на свет малыши весят примерно 80 г, при качественном питании набирая за 3 месяца около 2,8 кг. По продуктивности эта порода близка к Советской шиншилле и Белому великану.

Самки высокой молочности и заботливые мамы, в окроле приносят около 9 крольчат. Кролики ценятся за шкурку отличной опушенности (мех короткий, густой, блестящий), за оригинальный окрас волосяного покрова (от носа к хвосту вертикальные белые зоны сменяются черными), который полностью формируется в возрасте 8 месяцев. Цвет темных пятен может быть разный, например, черный, шоколадный серый и т. п. Хотя основным цветом кролика все равно считается белый. Цвет глаз, как правило, темно-коричневый или серо-голубой.

В России этих кроликов разводят преимущественно в Средней полосе.

Представителей Голландской породы можно держать как домашних животных, но совсем маленькие дети (до 7 лет) с ними не справятся в одиночку. По характеру такие кролики добрые, общительные, порой весьма подвижны, умны и без труда могут быть выдрессированы. В качестве домашних питомцев их часто заводят на Западе.




Рис. 16. *Голландская*

Белка

Родина породы – город Марбург в Германии, где в первой четверти XX в. она была выведена путем скрещивания представителей пород Гавана и Венский голубой. По размеру кролики средние. Мех светло-голубой с сиреневым оттенком. По анатомии и внешним данным кролики этой породы близки к кроликам породы Венский голубой, но качество волосяного покрова ниже.

Телосложение зверьков правильное, крепкое. Зрелые особи весят в среднем 4,3 кг. Помимо вкусного мяса, от Белок получают замечательные шкурки разного размера, которые похожи на меховую шубку алеутских белок.

Самки приносят 6 крольчат за один окот. Молочность их невысока. Порода мало распространена в России, представлена, в основном, в любительских хозяйствах.

Баран

Довольно большие декоративные кролики разнообразной окраски с уникальными длинными ушами. Порода ведет свое происхождение из Англии, где занимались целена-

правленной селекцией для выделения устойчивой группы кроликов с необычной природной мутацией формы ушной раковины. По большей части именно из-за оригинальных ушей Бараны пользуются популярностью. Уши порой бывают длиной до 70 см (ширина около 13 см плюс-минус 3 см).

Кролики этой породы нашли отклик у кролиководов-энтузиастов на Западе, где путем скрещивания Барана и Фландра получили местные разновидности Баранов. Породу улучшали и в конце концов добились живой массы, равной в среднем 3 кг, иногда масса доходит до 7 кг, а в редких случаях и до 10 кг.

Характерные черты: крупная массивная голова, широкий лоб, нос чуть загнут вниз, а уши висят (внешнее сходство с бараном, отчего порода и получила свое название), туловище удлиненное (длиной около 65 см), сбитое, широкое, спина тоже (бывает, что она провисшая), грудь широкая.

Представители этой породы быстро растут. Мясные формы отлично развиты, что могло бы служить отнесением их к кроликам мясной продуктивности. Самки за один раз в среднем приносят от 3-х до 6-ти малышей.

От Баранов получают довольно крупные шкурки с густым, плотным, мягким мехом. В России эти кролики распространены мало, обычно в хозяйствах кролиководов-любителей.

Карликовый баран

Родиной данного подвида породы Баран являются Нидерланды. Этих маленьких кроликов прозвали баранами за миниатюрные ушки, похожие на бараньи. Физиологическая особенность кроликов в том, что они плохо слышат, виной чему служат маленькие ушки. Может быть, поэтому

Карликовые бараны не слишком пугливы – их спокойствию при резких звуках и движениях могли бы позавидовать многие другие кролики, да и люди тоже. Кроме того, Бараны отличаются добрым нравом, дружелюбием, поэтому отлично подходят в качестве домашних животных. На данный момент Карликовый баран считается самым популярным у любителей кроликов.




Рис. 17. Карликовый баран

Туловище кроликов бочонкообразной формы, коренастое, с изящной линией спины, короткой шеей (практически незаметной), передние конечности короткие, толщина умеренная, хвост небольшой, прижатый к туловищу, грудь широкая, без подгрудка

у самок, ровный волосяной покров, достаточно мягкий, густой подшерсток, уши густо обросшие шерстью, голова массивная, с широким лбом и большими глазами. Уши висят, прижатые к голове, в основании утолщены, мясистые, длиной в среднем 25–27 см.



В Москве кролики этой породы впервые появились в конце 1998 г., а привезли их с 25-й Европейской выставки, проходившей в Чехии. В тот год москвичи на выставке кроликов имели возможность увидеть европейского чемпиона по кличке «Пусик».

Весят Карликовые бараны обычно около 2 кг, иногда чуть больше или меньше. Окрас шкурок разнообразный: белый, черный, серый, желтый, голубой.

Львиная голова

Родиной этих кроликов является Бельгия. Но в мире редко можно встретить эту породу в чистом виде. В России милых и обаятельных кроликов ценят многие любители. У Львиной головы даже есть своего рода фанаты.

Если посмотреть на изображение этого забавного зверька, то станет ясно, откуда пошло название: внешне он похож на миниатюрного львенка с торчащими ушами. В наличии также «грива», т. е. длинные волосы вокруг головы, тогда как остальной волосяной покров более короткий (его длина не превышает 5–7 см). Вес этих кроликов совсем незначительный – около 1,5 кг, туловище короткое, ноги умеренной длины, уши торчащие, короткие (около 3 см). Цвет глаз такой же, как общий окрас, а он, в свою очередь, может быть абсолютно разным.

Существует мнение, что порода Львиная голова получилась в результате скрещивания короткошерстных и пушистых пород.

Поскольку шерсть у кроликов не скатывается, то какого-то особого ухода не требует, что служит дополнительным преимуществом этих кроликов как домашних питомцев (питомца только не нужно забывать прививать). По характеру они дружелюбные, приручаются быстро, ласковые, флегматичные, но при этом интересные в игре. Можно гулять с ними на поводке. Как и любых кроликов, их нельзя брать за уши.

Надо сказать, что «грива» образуется уже в совсем юном возрасте. У этих кроликов есть специфическая черта: непропорциональность, которая проявляется в слишком длинном теле по сравнению с крохотными ушами. Именно благодаря этой несуразности кролики довольно забавны и очень милы. Что касается особенностей содержания в домашних условиях, то кролики этой породы считаются лучшими друзьями, подходящими и взрослым, и детям.

Гермелин

Название имеет польские корни. Изначально гермелины стали результатом скрещивания диких кроликов, голландских чисто белого окраса и небольших серебряных. Происхождение красноглазых представителей этой породы неразрывно связано с Англией, где они появились во второй половине XIX в. Синеглазые особи этой породы выведены в Германии в первой четверти XX в. В четвертой четверти XIX в. и до начала XX в. гермелины (или польские кролики) нередко участвовали в выставках и служили объектом интереса кролиководов. Тогда гермелины были несколько другими внешне, чем нынешние образцы этой породы. Были крупнее, с маленькой головой (не в форме шара, как у современных представителей породы).

Гермелинов полюбили в том числе и за их кроткий дружелюбный нрав. Зверьки с красными глазами более распространены, чем с синими. Огромный вклад в улучшение породы внесли немецкие и голландские селекционеры. Сейчас многие кролиководы занимаются разведением гермелинов: у них короткое туловище, формой похожее на цилиндр, конечности короткие тонкие, маленький прижатый к телу хвостик, мех белый глянцевого (при наличии оттенков констатируют дефект), грудь широкая, у самок без подгрудка, голова крупная, шея не наблюдается, уши прямостоящие, короткие (около 5–6 см), изящно скруглены (заостренная форма, длинные уши, мясистость считаются дефектом), глаза большие, почти круглые, выпученные.

Поскольку в процессе разведения не акцентировали внимания на способность к размножению, то она осталась очень низкой: крольчат рождается мало, а иногда спаривания вообще не приносят результата, оказываясь бесплодными. В настоящее время селекционеры сосредоточены именно на этой проблеме. Существует убеждение, что виной такому недостатку служит слишком маленький размер кролика.

Надо отметить, что для неопытного кроликоведа порода будет проблемной, а для опытного весьма интересна. По характеру польские кролики привязчивые, мягкие, спокойные. Живая масса составляет всего около 0,9–1,2 кг. Именно от гермелинов берут свое начало карликовые кролики: цветные карлики, Карликовые лисы, Карликовые рексы и Сатиновые карлики, которые отличаются друг от друга типом волосяного покрова, а цвет практически одинаковый с некоторыми отличиями в длине волос.

Тем, кто собирается завести гермелина в качестве домашнего животного, следует помнить, что эти кролики много и подолгу линяют, так что необходимо регулярно вычесывать питомцев, иначе волосы устелят весь пол. Кроме того, эти кролики не любят высокую температуру и духоту, поэтому помещение, где они содержатся, должно хорошо вентилироваться. Местом содержания может служить клетка размером 1 × 1 м. Питание должно быть натуральным: фрукты, овощи, молодые побеги, сено, трава, но никак не ягоды с косточками. Прожить кролики могут до 9 л.

Определение типа конституции и оценка экстерьера

Конституция кроликов представляет собой целую совокупность анатомических и физиологических особенностей каждой особи, которая обусловлена прежде всего наследственностью, условиями, в которых содержалось животное, характером продуктивности, общим иммунитетом, а также способностью организма кролика так или иначе реагировать на воздействие внешней среды.

С конституцией связаны многие признаки, оказывающие влияние на разведение пород в сельском хозяйстве. К ним относят скороспелость, мясность, качество шерсти, жизнеспособность и устойчивость к различным болезням. Конституция определяется за счет внешнего вида, а также по данным индексов, среди которых ведущим является индекс сбитости. Этот показатель определяется с помощью двух основных промеров: обхват груди животного за лопатками и общая длина тела. Для вычисления индекса сбитости первый показатель требуется разделить на второй, а получившееся число умножить на 100.

Чаще всего кроликов по этому индексу разделяют на три группы – узкотелый (лептосомный), промежуточный (мезосомный) и широкотелый (эйрисомный).

Кролики, относящиеся к первому типу, имеют достаточно длинное и узкое тело, грудь у них узкая и глубокая. Спина длинная и прямая, но вместе с тем тоже узкая. Мускулатура у таких пород обычно не слишком сильно развита. Обмен веществ у этих кроликов ускоренный, а индекс сбитости составляет 56 % или даже меньше.

Широкотелые кролики имеют не слишком длинное туловище, однако грудь у них широкая и глубокая, спина прямая и короткая. Мускулатура очень хорошо развита по сравнению с узкотелыми кроликами, кроме того, обмен веществ у них замедленный. Индекс сбитости у таких особей находится в пределах 65 %, в некоторых случаях превышает этот показатель.

Промежуточный тип имеет средние показатели по сравнению с двумя рассмотренными выше группами. Индекс сбитости у них находится в промежутке между 56–64 %.

Помимо внешних отличительных характеристик, кролики с разным типом конституции могут отличаться и по внутренним особенностям. Узкотелые кролики имеют особенное строение щитовидной железы, которое говорит о ее интенсивной деятельности, кроме того, их кости достаточно длинные и гораздо прочнее костей кроликов, относящихся к другим группам. В ходе биологических исследований были также выявлены и другие особенности, связанные с морфологическим и биохимическим составом крови животных. Телосложение и конституция оказывают очень сильное влияние на репродуктивные функции кроликов.

Существует также классификация, основанная на типах конституции: грубый, плотный, нежный и рыхлый. Особи, относящиеся к грубому типу, имеют мощный и крепкий костяк, достаточно толстую кожу и грубую шерсть. Их мускулатура развита относительно хорошо, однако жира в них практически не наблюдается. Голова у таких животных крупная, грудная клетка достаточно широкая, при этом лапы толстые и массивные. Грубый тип кроликов очень неприхотлив и способен хорошо сопротивляться разного рода заболеваниям.

У кроликов нежного типа костяк значительно тоньше по сравнению с грубым, шерсть короткая и редкая. И мускулатура, и жировая ткань развиты не слишком хорошо. Голова не очень большая и тяжелая, грудь не глубокая. У кроликов нежного типа ускоренный обмен веществ, кроме того, они характеризуются возбудимостью и неустойчивостью к болезням.



Экстерьером кролика называется его общий внешний вид и форма тела. Этот показатель оценивают, исходя из обычного осмотра различных частей тела животного. Профессионалы, занимающиеся разведением кроликов, могут сразу определить, насколько хорошо развит костяк, форму и размер головы, спины, глубину груди.

Рыхлый тип отличается мощной мускулатурой и толстой плотной кожей, однако волосяной покров редкий. Костяк у животных легкий, их можно быстро откормить, так как жировой слой у них достаточно развит. Животные рыхлого типа очень сильно подвержены болезням, при этом они отличаются пониженным обменом веществ.

Экстерьер начинают оценивать с головы особи, а заканчивают лапами. Особое внимание в ходе этого процесса обращают на развитие костяка, мускулатуры и общее состояние животного. При осмотре кролика надо учитывать некоторые особенности, которыми отличается каждая из пород.

Это связано, в первую очередь, с формой головы, так как каждая порода имеет свою уникальную форму, кроме того, у самцов голова намного крупнее по сравнению с женскими особями. Отличительным признаком породы является форма ушей животного. Крупные породы зачастую имеют длинные и прямостоячие уши, висячие уши обычно считаются недостатком, за исключением некоторых отдельных пород.

Если животное крепкое и здоровое, об этом говорит глубокая и широкая грудь. Спина и поясница независимо от породы кролика должны быть ровными, широкими и прямыми. Мышечная структура животного также должна находиться в тонусе, т. е. везде мускулатура должна быть твердой и плотной, особенно это относится к бокам и участку вдоль поясницы.

Если кролик мясной породы, то шея у него будет короткой и мускулистой. Длинная и тонкая шея говорит о слабой конституции животного. Когда оценивают грудную клетку животного, обязательно обращают внимание на так называемый подгрудок. Он представляет собой кожную складку, которая формируется у кроликов в процессе их полового созревания. Если подгрудок хорошо развит у самки, это является показателем ее хороших материнских качеств и спокойного характера.

Если подгрудок слишком сильно развит у самцов, то это говорит о флегматичности животного. Кроме того, кроликов со слишком большим подгрудком не оставляют для разведения.

Очень важную роль в определении конституции животного играет состояние кожи. Если кролик крепкого типа, то кожа у здорового животного будет плотной и эластичной. Рыхлая кожа говорит о сырой конституции. Кролики, принадлежащие к нежному типу, имеют тонкую кожу, которая очень легко оттягивается.

У кроликов вполне возможны дефекты и пороки телосложения. К ним можно отнести неправильную форму головы, которая никак не связана с данной породой, висячие уши, отвисший живот, не слишком хорошо развитый в процессе взросления костяк, горбатую или провислую спину, слишком узкую грудь, обвислый круп и т. д. Таких животных обычно

выбраковывают из основного стада, так как они не в состоянии полноценно выдерживать высокую интенсивность размножения и развития.

Мясные породы иногда имеют свою собственную конституцию. Например, у Новозеландского белого и Калифорнийского кроликов достаточно мясистые задние лапы, мышцы на спине у них развиты очень сильно. Шея у животных короткая и мускулистая, лопатки широкие. Задняя часть очень широкая и округлая. С внутренней поверхности бедра мышцы очень сильно развиты. Голова у самцов этих пород значительно крупнее по сравнению с самками. Кожа и мускулатура рыхлые, но очень эластичные. Подкожная и жировая ткань сильно развиты.

Конституция кролика не является чем-то статичным и неизменным, она может претерпевать очень большие изменения в зависимости от того, в какой климатической зоне выросло животное. Наибольшее влияние климат оказывает на волосяной покров и телосложение кролика, зачастую от этого изменяются размеры внутренних органов.

Конституция может изменяться также в зависимости от корма. Количество и качество пищи животных оказывает сильное влияние и на репродуктивные функции, реакцию крови, строение скелета и некоторые другие особенности организма. Если в организме животного недостаточное количество белка, то костяк будет недоразвитым, задние конечности тоже не смогут получить полноценного развития, пропорции тела могут нарушиться, а также снижаются иммунологические показатели крови.

Следует отметить, что на развитие кроликов оказывают значительное влияние и сезонные условия. Например, крольчата, появившиеся на свет в январе, будут весить гораздо больше по сравнению с родившимися в марте, также у них будет более густой волосяной покров, а шкурка полностью созреет уже к четырем-пяти месяцам. Кролики, родившиеся в летние месяцы, развиваются гораздо хуже. Это объясняется тем, что в холодное время года ускоряется обмен веществ. Тип конституции и возраст родителей животного также сильно влияют на качество потомства. Если спариваться будут очень молодые или же очень старые особи, то молодняк родится маложизненным. Это обычно находит выражение в ослабленной конституции, резком снижении плодовитости и выживаемости потомства. Самое хорошее потомство получается от животных среднего возраста.

Ученые-агроарии рекомендуют для правильного разведения кроликов отбирать здоровых самок и производителей, причем выбор должен происходить по выраженности диморфизма в экстерьере. У качественного самца должна быть хорошая конституция, достаточно бодрый вид и жесткий волосяной покров. Самка, пригодная для получения потомства, обязана иметь хорошее здоровье и физическое развитие. У племенной женской особи присутствует достаточно крепкий, но не слишком грубый костяк. По сравнению с самцом, у нее голова нежнее и более длинная. Кроме того, у самки должны быть прямая линия спины, округлая грудь, широкий зад.

Чтобы получить качественное потомство кроликов, необходимо производить правильный отбор. Он заключается в выделении из общего стада особей, наиболее подходящих по всем критериям. Эти кролики должны представлять собой максимальную ценность по племенным и продуктивным характеристикам.

Молодняк после рождения необходимо отсадить от матери, когда им исполнится примерно месяц или полтора (на возраст оказывает сильное влияние количество пометов в год). Отсаженный молодняк надо разместить в клетках по полу, возрасту и уровню развития. Чтобы определить пол крольчонка, его берут левой рукой за шкурку в районе крестца, захватив при этом хвост. Далее его переворачивают брюшком вверх. Затем правой рукой немного убирают кожу на брюшке. Если это самка, то у нее будет видна там небольшая продолговатая щель, уходящая в область хвоста, а у самцов на этом месте находятся первичные мужские

половые признаки. Кролика, отстающего от других по росту и развитию, требуется посадить в отдельную клетку и давать большее количество корма, нежели другим особям.

В клетке обязательно должны находиться поилки и кормушки, куда закладывают концентраты, грубые и зеленые корма. Молодняк размещают в клетках в количестве до 7-ми голов. При этом все время следят за крольчатами, так как они могут очень часто драться, вследствие чего на коже появятся рубцы, сильно портящие шкурку. Если кролик сильно драчливый, его следует отсадить от общей группы, а впоследствии и выбраковать. В сложившуюся группу кроликов не нужно подсаживать новых крольчат, так как они вряд ли там приживутся. Когда возраст молодых особей достигнет 3-х месяцев, самцов нужно будет рассадить в клетки по одному, самок же в одной клетке можно держать по три особи.

Кролики одной породы имеют очень большое количество самых различных наследственных изменений, образующихся из-за разных причин, к которым, прежде всего, относятся условия существования. Дело в том, что любой живой организм находится в очень тесном взаимодействии с окружающей средой, в которой развивался не только он сам, но и многие поколения его предков.

Племенная работа включает в себя целый комплекс действий, куда входят отбор особей для спаривания, выращивание молодняка, ведение учета, оценка племенных характеристик кроликов. Племенная работа заключается в максимальном усовершенствовании самых полезных хозяйственных качеств кроликов, за счет которых можно добиться наивысшей экономической эффективности их разведения.

В индивидуальном хозяйстве кроликов держат не слишком много – всего около пяти или десяти самок, регулярно приносящих приплод, поэтому здесь нет достаточного материала для отбора. В небольшой группе вряд ли можно найти необходимое сочетание требуемых качеств животного. Однако даже в этом случае нужно внедрять хотя бы некоторые элементы, связанные с племенной работой.



Животных для разведения необходимо отбирать, руководствуясь несколькими основными признаками, каждый из которых играет одну из важнейших ролей при получении потомства. Очень большое влияние на ценность кроликов оказывает их способность к дальнейшему размножению, причем данный признак также определяется за счет большого количества разнообразных факторов.

В племенной работе успеха добиваются за счет правильного отбора поголовья, грамотного сочетания родительских пар. Однако все это может оказаться бесполезным и бессмысленным, если кролики испытывают недостаток в корме или же находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии. В этом случае генетический потенциал животных будет либо не совсем полностью раскрываться, либо животные могут вовсе потерять способность к размножению, а это в итоге может привести к потере достаточно ценных генетических экземпляров. Все это отрицательно скажется на качестве потомства, так как отбор кроликов будет производиться среди оставшихся особей, которые уже не представляют собой ценные генетические виды, а просто оказались более выносливыми животными.

Выбирать нужно подвижных и упитанных кроликов, в первую очередь обращая внимание на их телосложение. Если у животного, например, выступают бедра, вытянута шея и голова, слишком далеко сидят друг от друга уши, а их кончики свисают, спина при этом провисла или имеет горб, а также есть какой-нибудь из существенных недостатков, то не следует использовать такие особи для разведения. Если у кролика узкая грудь, то скорее всего потомство родится достаточно хилым. При широкой и глубокой груди (она свидетельствует о здоровье и крепкой конституции особи) потомство получится максимально жизнеспособным. Самцов выбирают с округлой и массивной головой, а самок, предназначенных для разведения, – с удлиненной.

В зависимости от того, для чего разводят кроликов и в какое время года происходит спаривание, масса взрослого поголовья (в некоторых случаях и молодняка тоже) может значительно варьироваться. Каждой породе присущ собственный цвет волосяного покрова. Цвет шкурки у кроликов должен быть однородным. Если же крольчата родились с расщепленным по цвету мехом, то их не стоит выращивать для последующего разведения, лучше их пустить в рост для получения мяса.

Молодых самок можно возвращать в стадо сразу после того, как они заканчивают кормить свое потомство, молодых же самцов помещают в стадо, когда они достигнут возраста не менее 5-ти месяцев.

В предназначенную для размножения группу отбирают только самых лучших кроликов. Ее размер определяется многими факторами, главным из которых является потребность в качественном молодняке. Ежегодно нужно делать так, чтобы стадо обновлялось приблизительно на одну треть. Для селекционной группы подбирают животных, родившихся в зимнее время года, так как у них максимально густой волосяной покров на теле, а также хорошая жировая прослойка. Чтобы проверить, насколько качественным оказался выбор, к самцам подсаживают одинаковых по всем показателям крольчих. После того как крольчихи принесут потомство, самцов можно отбирать в племенную группу. Однако перед этим максимально внимательно проверяют, насколько качественными получились крольчата. Это оценивают по суточному приросту массы во время материнского кормления, а также после отсадки в отдельную клетку или вольер. Качественным считается потомство, если молодняк до достижения 3-месячного возраста ежедневно прибавляет в весе до 40 г.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.