АЛИСА КАРИМОВА

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ



Алиса Каримова

Лечение острого бронхиолита у детей

«Издательские решения»

Каримова А.

Лечение острого бронхиолита у детей / А. Каримова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-900653-0

Лечение легко протекающего бронхиолита у детей можно проводить на дому. Тщательный уход, свежий и прохладный воздух, адекватная регидратация являются достаточными.Дети со среднетяжелой или тяжелой формой бронхиолита должны быть госпитализированы.Пособие для медицинских работников.

ISBN 978-5-44-900653-0

© Каримова А.
© Издательские решения

Содержание

Введение 6
Конец ознакомительного фрагмента. 7

Лечение острого бронхиолита у детей

Алиса Каримова

© Алиса Каримова, 2019

ISBN 978-5-4490-0653-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Лечение легко-протекающего бронхиолита у детей можно проводить на дому. Тщательный уход, свежий и прохладный воздух, адекватная регидратация являются достаточными.

Дети со среднетяжелой или тяжелой формой бронхиолита должны быть госпитализированы.

Цели лечения в больнице – контроль за состоянием ребенка; определение и коррекция возможных осложнений; лечение специфическими противовирусными препаратами (если возбудитель определен). Получить больничный лист может мама или другой человек, ухаживающий за ребенком с острым бронхиолитом, на основании заключения педиатра.

Существуют противоречивые взгляды на использование специфических противовирусных препаратов, бронходилататоров и кортикостероидов в лечении бронхиолита.

Поддерживающая терапия для госпитализированных детей с бронхиолитом включает ингаляции кислорода. Необходимо мониторировать частоту дыхания и сердечной деятельности, температуру тела, газовый состав крови, кислотно-основное состояние, насыщение крови кислородом, водно-электролитный баланс.

Главным последствием обструкции дыхательных путей и сопутствующего нарушения вентиляции и перфузии является гипоксемия, определяющая тяжесть состояния ребенка. Нарушение соотношения между вентиляцией и перфузией приводит к гипоксемии и требует назначение 40% кислорода. Газовая смесь должна быть увлажненной, скорость движения газа через устройство должна быть достаточной для предотвращения накопления углекислого газа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.