

strain or

circumstances

a lot of stress

V

or depressive

their physical

CIN

Алиса Каримова

**МУЖСКАЯ
ПРОБЛЕМА —
РАННЕЕ
ОКОНЧАНИЕ**

Советы врача

МУЖСКАЯ
ПРОБЛЕМА —
РАННЕЕ
ОКОНЧАНИЕ

Советы врача

Алиса Каримова

**Мужская проблема – раннее
окончание. Советы врача**

«Издательские решения»

Каримова А.

Мужская проблема – раннее окончание. Советы врача /
А. Каримова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-901642-3

Раннее окончание — это половая дисфункция у мужчин, при этом извержение происходит в самом начале занятия сексом. Очень многие мужчины в жизни сталкиваются с преждевременным семяизвержением, но на самом деле в этом нет ничего страшного. Однако, если это происходит систематически, то вызывает дискомфорт у обоих партнеров. Важно понимать, что семяизвержение считается преждевременным, если происходит в течение 60—120 секунд после начала акта.

ISBN 978-5-44-901642-3

© Каримова А.
© Издательские решения

Содержание

Введение	6
Причины преждевременного семяизвержения	7
Конец ознакомительного фрагмента.	8

Мужская проблема – раннее окончание Советы врача

Алиса Каримова

© Алиса Каримова, 2017

ISBN 978-5-4490-1642-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Раннее окончание – это половая дисфункция у мужчин, при этом извержение происходит в самом начале занятия сексом. Это не дает удовлетворения обоим партнерам, нарушает сексуальные отношения и может вызвать чувство неуверенности у мужчины. Встречается довольно часто, в 25—50% половых актов. Очень многие мужчины в жизни сталкиваются с преждевременным семяизвержением, но на самом деле в этом нет ничего страшного. Однако, если это происходит систематически, то вызывает дискомфорт у обоих партнеров. Важно понимать, что семяизвержение считается преждевременным, если происходит в течение 60—120 секунд после начала акта.

Причины преждевременного семяизвержения

Очень часто эта проблема встречается у тех особей мужского пола, у кого имеются психологические проблемы. Это может быть страх неудачи, волнение, тревожность в юношеском возрасте. Если неудачный половой акт повторился несколько раз, он может закрепиться на психофизическом уровне. Нарушения психологического характера могут возникнуть также и у тех, кто в юности боялся быть «застуканным» родителями.

Причины могут иметь и физиологический характер, например воспаление придатков половых органов, воспаление семенного бугорка (колликулит), воспаление простаты, аденома простаты, осложнения после водянки яичка. На раннюю эякуляцию может повлиять анатомическое строение полового органа (укорочение уздечки; фимоз – сужение крайней плоти; искривление пениса), чувствительность рецепторов в головке члена. В некоторых случаях гормональные расстройства ведут к уменьшению выработки необходимых гормонов. Гормональные расстройства могут быть вызваны приемом медикаментозных гормональных препаратов. Проблема также может возникнуть из-за наследственных факторов или родовой травмы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.