



САМАЯ НЕВЕРОЯТНАЯ

КНИГА
О ДИНЮЗАВРАХ

Аванта

УДК 087.5:568.19
ББК 28.1я2
Б24

Серия «Самая невероятная книга» основана в 2018 году

Б24 Барановская, Ирина Геннадьевна.

Невероятная книга о динозаврах / И. Г. Барановская. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 191, [1] с. : ил. — (Самая невероятная книга). ISBN 978-5-17-107882-9.

Это издание будет интересно всем юным любителям динозавров. Ведь здесь собрана уникальная информация о животном мире всех континентов нашей планеты в доисторические времена. В этой книге представлены основные виды динозавров с описанием их облика, повадок и особенностей поведения. Многочисленные яркие иллюстрации, сопровождающие емкие статьи, помогут детям лучше вообразить себе основных представителей древнейшего животного царства. Для удобства читателя самые важные сведения собраны в краткие заметки, а интересные факты из жизни ископаемых ящеров сделают чтение этой невероятной книги еще более полезным и занимательным.

Для среднего и старшего школьного возраста.

УДК 087.5:568.19
ББК 28.1я2

ISBN 978-5-17-107882-9

© Оформление, обложка, иллюстрации
ООО «Интеджер», 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
© В оформлении использованы материалы,
предоставленные Фотобанком Shutterstock, Inc.,
Shutterstock.com, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ДИНОЗАВРЫ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ	6
Динозавры — древние рептилии	8
Как давно жили динозавры	10
Предки динозавров	12
Теплокровные и холоднокровные	16
Как питались динозавры	18
Растения во времена динозавров	20
Средства защиты	22
Классификация динозавров	24
Потомство	26
Конец эры динозавров	28
Исследователи динозавров	30
Что сохранилось от динозавров	32

ЕВРОПА	34
Барионикс	36
Игуанодон	38
Компсогнат	40
Мегалозавр	42
Платеозавр	44
Сальтопус	46

АЗИЯ	48
Бактрозавр	50
Велоцираптор	52
Галлимимус	54
Маменчизавр	56
Овираптор	58
Пситтакозавр	60



Тарбозавр	62
Цинтаозавр	64



СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА	66
Акрокантозавр	68
Аллозавр	70
Анкилозавр	74
Апатозавр	78
Дасплетозавр	82
Дейноних	84
Дилофозавр	88
Диплодок	90
Зауропельта	92
Коритозавр	94
Орнитомим	98
Пахицефалозавр	100
Сколосавр	104
Стегозавр	106
Стигимолох	110
Струтиомим	112
Тираннозавр	114
Трицератопс	118
Троодон	122
Целофизис	124



ЮЖНАЯ АМЕРИКА	128
Абелизавр	130
Гиганотозавр	132
Карнотавр	134
Сальтазавр	136
Ставрикозавр	138



АФРИКА	140
Барозавр.....	142
Брахизавр.....	144
Вулканодон.....	148
Кархародонтозавр.....	150
Спинозавр.....	152
Цератозавр.....	156
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ	158
Австраловенатор.....	160
Дайамантинозавр.....	162
АНТАРКТИДА	164
Криолофозавр.....	166
РЕПТИЛИИ ВОЗДУХА	168
Диморфодон.....	170
Птеранодон.....	172
Птеродактиль.....	174
Рамфоринх.....	176
РЕПТИЛИИ ВОДЫ	178
Ихтиозавр.....	180
Кронозавр.....	182
Мозазавр.....	184
Саркозух.....	186
Шонизавр.....	188
Эласмозавр.....	190



Динозавры на планете Земля

Планета Земля начала формироваться примерно 4,5 млрд лет назад. Разумеется, она не всегда была такой, как сейчас. Наша планета пребывает в постоянном движении. Ее поверхность, словно из частей мозаики, состоит из тектонических плит — огромных участков земной коры. Они непрерывно движутся, хотя это и не замечают обитатели Земли. Данный очень длительный процесс заставляет материки очень медленно-медленно перемещаться на тысячи километров, а иногда и вращаться. Под влиянием этих глобальных перемен жизнь на планете тоже меняется.



Пангея

Динозавры появились на Земле около 225 млн лет назад. В это время все материки были соединены в один суперконтинент — Пангею. Ничто не мешало динозаврам бродить по планете, как им вздумается, поэтому сегодня их окаменелости находят на всех континентах.

Пангея



Современный мир



Теория дрейфа материков

Много лет назад люди были уверены, что расположение континентов не менялось с самого появления Земли. Только в начале XX в. немецкий ученый Альфред Вегенер выдвинул гипотезу о том, что материки медленно движутся. Сначала его теорию восприняли как фантастическую. В то время люди не знали о силах, которые могли бы заставить двигаться целые континенты.

Несмотря на то что гипотеза хорошо объясняла многие совершенно непонятные до этого факты о нашей планете, от нее отказались и долгое время вспоминали только как о курьезе. Но во второй половине XX в. было научно доказано, что существуют процессы, способные двигать материки. Тогда ученые вспомнили о теории Вегенера. Им пришлось пересмотреть многие взгляды о том, как была устроена Земля до появления людей.



Как движение материков влияет на климат

От расположения материков и океанов зависит, сколько солнечного тепла поглощает и отражает Земля. На сравнительно небольших участках суши и в прибрежных районах климат достаточно мягкий и влажный. Когда же материки объединяются в один большой суперконтинент, морские ветры, которые несут влагу, не достигают центральных районов, климат во многих местах Земли становится более сухим и теплым — такие условия отлично подходили для динозавров.



ДИНОЗАВРЫ — ДРЕВНИЕ РЕПТИЛИИ

До сих пор люди очень мало знают о древних животных. Например, мы можем только предполагать, какого цвета были динозавры, так как их кожа до наших времен не сохранилась. Но по строению костей и особенностям организма этих животных ученые однозначно относят их к классу рептилий. Тем не менее динозавров не просто так выделяют в одну группу. Они в чем-то похожи на других рептилий, но в чем-то отличаются.



Чем динозавры похожи на современных рептилий

Динозавры откладывали яйца с твердой скорлупой, как рептилии. У них также была сухая и чешуйчатая кожа, как у современных ящериц или змей. А еще многие ученые предполагают, что большинство из них были холоднокровными, как крокодилы. То есть температура их тела была такой же холодной или теплой, как температура окружающей среды.



Основные отличия от современных рептилий


Динозавры ходили не так, как это делают современные рептилии, большинство из которых передвигается вперевалку, потому что лапы у них располагаются по бокам. А динозавры могли передвигаться и стоять, как это делают млекопитающие. Ноги у них находились прямо под брюхом. Некоторые динозавры, например аллозавр и тираннозавр, вовсе передвигались только на двух ногах.



Особенности в строении скелета

По строению скелета динозавры делятся на два основных отряда: ящеротазовые и птицетазовые. Первые по строению костей в области таза напоминают типичных рептилий, а вторые — птиц. Около 55% известных на сегодня динозавров принадлежали к отряду ящеротазовых, а 45% — к отряду птицетазовых. Вопреки схожести в названии, большинство современных ученых считает, что предками птиц были ящеротазовые динозавры, а не птицетазовые.

Тираннозавр — ящеротазовый динозавр.



Стегозавр — птицетазовый динозавр.



КАК ДАВНО ЖИЛИ ДИНОЗАВРЫ

История Земли разделяется на временные отрезки, которые называют эрами. Все динозавры жили во время мезозойской эры. Каждая эра разбивается на более короткие отрезки, называемые периодами. Большинство динозавров жили во время юрского периода.



Палеозойская эра

Палеозойская эра предшествовала эре появления динозавров. В начале палеозойской эры жизнь была сосредоточена в воде. Здесь обитали первые рыбы, акулы, моллюски и членистоногие. В середине эры на суше стали жить амфибии и насекомые. В конце палеозойской эры появились рептилии.

Аммонит — древний моллюск.

Триасовый период

В начале триасового периода существовало много видов рептилий. Они жили в сухом и жарком климате. В конце этого периода стали появляться первые динозавры.



Юрский период

Юрский — средний период мезозойской эры, продолжался около 56 млн лет. В это время на Земле жило огромное множество динозавров: от громадных медлительных гигантов до маленьких и быстрых ящеров.


Меловой период

Завершает мезозойскую эру самый продолжительный — меловой период. Продолжался раскол материков на более мелкие участки суши. Южная Америка и Африка удалялись друг от друга, а Атлантический океан становился все шире. Африка, Индия и Австралия тоже расходились в разные стороны. Динозавры больше не могли бродить по суше, как им вздумается. Они были вынуждены жить на тех материках, где застал их великий раскол континентов. В конце мезозойской эры все динозавры вымерли.



Кайнозойская эра

Мы живем во время кайнозойской эры. Она началась после мезозойской 66 млн лет назад и продолжается до сих пор. После того как вымерли древние рептилии, на Земле стали господствовать млекопитающие и птицы.



ИРЁДКИ ДИНОЗАВРОВ

Все животные постепенно развиваются из более простых организмов. Это называется эволюцией. Первые формы жизни зародились на Земле примерно 4 млрд лет назад. Это были простые бактерии, которые обитали в воде. Поначалу они были целиком мягкотелыми, то есть не имели костей. Затем у некоторых подводных обитателей стали появляться панцири, чешуя и раковины как средства защиты. От них примерно 540—500 млн лет назад произошли животные с хребтом, которые называются позвоночными. Среди них были первые рыбы.



Древний подводный мир

Первые многоклеточные организмы, которые развились из бактерий и обитали в океанах, были похожи на современных медуз и червей, только имели более плотное тело. Кроме них на морском дне жили губки и медузы.



Вауксия.

Древняя губка археоциат.



Пикайя.

Первые животные с панцирями

Первые животные с панцирями и раковинами появились примерно 540 млн лет назад. Некоторые из них принадлежали к группам животных, которые до сих пор живут на нашей планете, например моллюскам.



Трилобит.



Аномалокарис.



Опабиния.

Как появились четвероногие

От первых позвоночных животных примерно 500—430 млн лет назад развились древние рыбы и акулы. По виду они значительно отличались от современных родственников. От акул и рыб произошли первые четвероногие животные — ихтиостеги. Им нужны были мускулистые конечности, чтобы быстро передвигаться по дну. Эти древние животные вырастали до 1 м в длину и были хищниками, которые охотились на небольших рыб. Первые ископаемые останки этих древних четвероногих были найдены в Гренландии.



Древняя акула — кладоселахия.



Древняя рыба — ризод.

Выход на сушу


Со временем атмосфера на планете улучшилась, тогда на суше появились первые растения. Обитатели древних океанов, рек и озер стали предпринимать попытки выбраться на землю. Ведь там можно было спастись от грозных подводных хищников и достать больше корма. Так появились первые земноводные, а от них развились другие наземные животные, в том числе рептилии.

Скелет сеймурии — одного из первых четвероногих животных.



Первые наземные жители

Первые насекомые и паукообразные появились на Земле примерно 400 млн лет назад. Древние леса населяли многоножки, скорпионы, пауки и примитивные жуки, похожие на бескрылых тараканов. Приблизительно 360 млн лет назад на сушу из воды также стали выбираться первые амфибии. Они были совершенно не похожи на современных лягушек и жаб. Это были крупные, приземистые создания с огромной пастью и головой, которая достигала половины длины тела.



Появление рептилий

Древняя рептилия
диметродон.



Динозавры — самые известные древние рептилии, но далеко не единственные. Первые пресмыкающиеся были мелкими созданиями, не больше 10 см в длину. По виду они были похожи на современных ящериц. У них был длинный хвост, небольшие лапки и развитая вытянутая голова. Ученые называли их капторинами. Примерно 225 млн лет назад на Земле существовало уже много разных видов рептилий. Среди них были гиганты, весившие около 80 т, и карлики, в которых было не больше 3 г веса.

Текодонты

Динозавры произошли от группы животных, которые назывались текодонтами. Они первыми из всех рептилий встали на задние конечности. Текодонты могли стоять почти прямо, потому что их сильные ноги были практически прямыми. Эти рептилии быстро бегали как на двух, так и на четырех лапах. Текодонты были плотоядными, они питались мелкими рептилиями и насекомыми. В охоте им очень пригодилась способность быстро передвигаться, поэтому со временем они стали главенствовать на Земле. От текодонтов произошли не только динозавры, но и летающие птерозавры, а также современные крокодилы.



ТЕПЛОКРОВНЫЕ И ХОЛОДНОКРОВНЫЕ


Рептилии не имеют постоянной температуры тела и не могут ее регулировать. Это значит, что при жаркой погоде они становятся теплыми, тогда им приходится прятаться в тень, чтобы снизить температуру тела. А в холодную погоду они, наоборот, стараются выбраться на солнце, чтобы согреться, иначе не смогут быть достаточно активными, чтобы добывать пищу. Таких животных называют холоднокровными.

Несколько десятилетий назад ученые полагали, что все динозавры были холоднокровными, ведь они относятся к классу рептилий. Но благодаря последним открытиям считается, что некоторые динозавры могли быть теплокровными, как млекопитающие или птицы. Они оставались активными независимо от температуры воздуха и времени суток.

Мозг аллозавра

У некоторых динозавров, например аллозавра, был достаточно большой мозг. Это значит, что он нуждался в постоянной положительной температуре и достаточном питании кровью, чтобы работать эффективно. Только если аллозавр был теплокровным, его тело могло удовлетворить потребности такого большого мозга.





Кровеносные сосуды
в костях

Исследование костей под микроскопом

Кости теплокровных животных испещрены каналами от кровеносных сосудов. Исследователям удалось обнаружить кости динозавров, которые имели такие же отверстия. Поэтому вполне возможно, что они были теплокровными.

Чем больше, тем теплее

Большие животные медленно теряют температуру тела. Это одна из причин, почему многие холоднокровные динозавры были такими огромными. Так как их тело медленно теряло тепло, они дольше оставались активными в прохладную погоду. Большие динозавры могли накапливать тепло в течение дня и постепенно расходовать его ночью, когда нельзя погреться на солнце.



«Солнечные панели» на спине

Некоторые динозавры, например стегозавр, имели вертикальные костяные пластинки на спине. Ученые предполагают, что с их помощью можно было накапливать тепло. Такие пластинки были для динозавра своеобразными солнечными панелями. Они равномерно распределяли тепло по всему телу и быстро согревали стегозавра. Когда становилось холодно, он поднимал пластины, чтобы ловить солнечное тепло, а в жаркую погоду опускал их.



КАК ПИТАЛИСЬ ДИНОЗАВРЫ


Динозавры ели такую же пищу, как и современные животные. Среди них были хищники, питающиеся только мясом, и любители растений, которые так и называются — растительноядные.

Как разобраться, что ел динозавр

Ученые часто определяют, чем питались динозавры, по окаменелым остаткам пищи в их желудках. Например, такие сведения удалось получить о компсогнате, дейнонихусе и бариониксе. Их останки были найдены с полными желудками. Однако о питании большинства динозавров ученым приходится догадываться по зубам. У плотоядных ящеров длинные и острые зубы для разрывания и пережевывания мяса. Растительноядные динозавры ели в основном листву, поэтому у них короткие и ровные зубы, которые отлично подходят для перемалывания и перетирания пищи. Такие же отличия между острыми клыками волка и плоскими зубами овцы.



Короткие
и ровные зубы
растительноядного
динозавра.



Длинные и острые
зубы плотоядного
динозавра.



Хищники

Большинство плотоядных динозавров добывали себе пищу на охоте. Они нападали на растительноядных животных и даже друг на друга. Некоторые слабые хищники питались насекомыми. А были и такие динозавры, которые ели в основном падаль. Они питались уже умершими животными и старались в открытую не нападать на других ящеров. К хищным динозаврам относятся, например, тираннозавр, аллозавр и дейнонихус (дейноних).



Растительноядные динозавры

Растительноядные динозавры питались листвой деревьев, высокими растениями, кустарниками и папоротниками. Они были в основном спокойными ящерами и не нападали на других животных первыми, но могли обороняться. К растительноядным динозаврам относятся, например, диплодок, стегозавр и паразауолоф.



Всеядные динозавры

Некоторых динозавров нельзя однозначно отнести к категории плотоядных или растительноядных. Они питались всем, что могли найти: мясом, растениями, яйцами. Таких животных, которые могут есть любую пищу, называют всеядными. В качестве примера всеядных динозавров можно назвать орнитомима, овиратора и галлимима.